

ဆေးအမည် - အောက်စီဂိုးလ်

အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Oxyfluorfen 23% EC

ဆေးအာနိသင်

- ထိသေအာနိသင်ရှိသော ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးကို ပေါင်းပင်မပေါက်မီ၊ ပေါင်းပေါက်ပြီး အစောပိုင်းကာလများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့အာနိသင်ဖြင့် ပေါင်းပင်၏ အရွက်များမှ တစ်ဆင့်စုပ်ယူသည်။
- ဆေးသည်ပေါင်းပင်၏ အစာချက်လုပ်မှုကို ဟန့်တားပေးသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- စပါးအခြောက်ကြခင်း/တောင်ယာစပါး၊ မြေပဲ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးပင်များ၊ ဝါ၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ စသည့် စိုက်ခင်းများအတွင်းရှိ တစ်နှစ်ခံ မြက်မျိုးရင်းဝင်ပေါင်းများနှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည်။
- အခြားပေါင်းသတ်ဆေးများနှင့်လည်းရောသုံးနိုင်ပြီး ပေါင်းများအား အချိန်ကြာရှည်စွာ နှိမ်နင်းထားနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံ

- ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ စပါးအခြောက်ကြခင်း/ယာစပါးခင်း၊ မြေပဲ၊ လတ္တက်၊ အာလူး

နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ပေါင်း

- တစ်နှစ်ခံ မြက်မျိုးရင်းဝင်အပင်နှင့် တစ်နှစ်ခံ ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ
- စပါး (မြက်သီး၊ ဆင်ငိုမြက်/ဆင်ငိုလက်ကြား၊ ကြိတ်မှန်၊ လယ်ပုဒ)
- ကြက်သွန် (လေးခွမြက်၊ လက်သဲခွမြက်၊ မြူပင်၊ ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်၊ လိပ်ရင်ဘတ်)

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုချိန်
ကြက်သွန် ပျိုးခင်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၇ - ၁၀) စီစီ	အပင်ပေါက်ပြီး (၂၀) ရက်သားကျော်
ကြက်သွန် ပြောင်းရွှေ့စိုက်ခင်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀ - ၂၀) စီစီ	ပေါင်းအုပ်ဆေး/ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီး (၁၀-၂၀) ရက်သား

သတိပြုရန်

- မြေပြင်ပေါ် ဆေးဖျန်းသောအခါ ဆေးရည်မထိသောနေရာတွင် ပေါင်းပေါက်လာနိုင်သောကြောင့် နံစပ်အောင် ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။
- ဆေးဖျန်းသောအချိန်တွင် မြေကြီးအစိုဓာတ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုပါရန်။

Name - Oxy-GOLD

Active ingredient - Oxyfluorfen 23% EC

Product feature

- Oxy-GOLD is a selective and contact herbicide.
- Oxy-GOLD has pre-emergence as well as targeted post-emergence activity. As pre-emergence, it affects weed plants through direct contact at emergence.
- Oxy-GOLD readily absorbed by the foliage with very little translocation.
- Oxy-GOLD disturbs the photosynthetic activity of selective weeds.

Advantages

- Oxy-GOLD is used to control a wide range of annual broad leaved and grassy weeds in direct seeded rice, groundnut, vegetables, fruit crops, cotton, ornamentals etc.
- It can be used tank mixed with common herbicides for broad spectrum and extended weed control broad spectrum activity.
- Continue to be effective and prolong action in soil.

Applicable Crops

- Onion, Garlic, Tea, Potato, Groundnut, Direct Seeded Rice.

Target Pests

- Excellent control of both annual broadleaf & grassy weeds. Complete eradication of select weeds.
- Rice: Echinochloa sp., Eleusine indica (L.) Gaertn., Eclipta alba,
- Onion: Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild., Digitaria (Retz.) Koel., Chenopodium album, Amaranthus viridis, Trianthema portulacastrum L.

Uses and Recommendations

Crops	Dosage	Method/ Applicable Time
Onion nursery	(7- 10) cc per 16 L of water	More than (20) days after seedling
Onion Transplanted Field	(10 - 20) cc per 16 L of water	Pre-emergence/ (10 – 15) days after transplanting

Caution

- When spraying on the soil, it is necessary to spray it thoroughly because weeds may germinate in areas not touched by the Oxy-GOLD.
- It is necessary to have soil moisture at the time of spraying.