

ဆေးအမည် - ရွှေမယ်ဒလင်

အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Pendimethalin 33% EC

ဆေးအာနိသင်

- ပင်လုံးပျံ့ရွေးချယ်အာနိသင်ရှိ ကြိုတင်ပေါင်းအုပ်ဆေးဖြစ်သည်။
- မြေပြင်ဖျန်းဆေး အနေနှင့်သော်လည်းကောင်း ပေါင်းမပေါက်မီ ပေါင်းအုပ်ဆေး အနေနှင့်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ပေါင်းပင်များ၏ မျိုးစေ့များ အပင်မပေါက်နိုင်အောင် တားဆီးဟန့်တားပေးသည်။
- အမြစ်နှင့် အညွန့်များမှ ဆေးကို စုပ်ယူသည်။

အကျိုးကျေးဇူး

- သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုကို နည်းစေပါသည်။
- ရွှေမယ်ဒလင်ကို နှစ်စဉ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေပါသည်။

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျန်းသောအချိန်တွင် စိုက်ခင်းအစိုဓာတ်ရှိရမည်။ ရေမဝပ်စေရပါ။
- ကြိုတင်ပေါင်းအုပ်ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် တန်းကြားပေါင်းများအား ဖျန်းပါက သီးနှံပင်များကို မထိအောင် ဂရုစိုက်ရမည်။
- ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုပါရန်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးနှင့် ပေါင်းများ	နှုန်းထား	အသုံးပြုရန်နည်းလမ်း/ အသုံးပြုရန်အချိန်
စပါးအခြောက်ကြဲခင်း/ ယာစပါးခင်း	မြက်မျိုးရင်းဝင်ပင်များနှင့် တစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် ဆေး (၁၅၀ - ၂၀၀) စီစီ	စပါးမျိုးစေ့ချပြီး/ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီး (၂) ရက်အတွင်း
ကြက်သွန်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ခင်း/ ဥစိုက်ခင်း	မြက်မျိုးရင်းဝင်ပင်များနှင့် တစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် ဆေး (၂၀၀) စီစီ	အစိုဓာတ်ရှိချိန်/ စိုက်ပျိုးပြီးပြီးချင်းဖျန်း ရန်

ပဲပုပ်၊ မြေပဲ၊ ဝါ၊ နေကြာ၊ ပြောင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	မြက်မျိုးရင်းဝင်ပင်များနှင့် တစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် ဆေး (၂၀၀) စီစီ	သီးနှံမစိုက်ခင် မြေပြင်ဖျန်းဆေး အနေဖြင့် အသုံးပြုရန်
--	--	--	--

Name – Shwe Methalin

Active Ingrdient – Pendimethalin 33% EC

Product Feature

- It is a selective systemic herbicide.
- It acts both pre-emergence, that is before weed seedlings have emerged, and early post-emergence.
- It inhibits cell division and cell elongation.
- It absorbed by the roots and leaves.

Advantages

- It controls the weed population and prevents weeds from emerging, particularly during the crucial development phase of the crop.
- Due to the annual use of Shwe Methalin, weeds in the paddy field are significantly reduced year after year.

Caution

- Must be moist soil when the time of spraying. Don't let the waterlogging.
- Due to the pre-emergence herbicide, if you spray between the rows of plant, you must take care not to touch the crop plants.
- Use only clean water when mixing.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage	Method/ Application time
Dry seeded rice/ Upland rice	Grasses and Annual broad leaf weeds	(150 – 200) cc per (16) lit of water	Pre-emergence/ Within (2) days of sowing or after transplanting
Onion transplanted field	Grasses and Annual broad leaf weeds	(200) cc per (16) lit of water	Spray immediately after transplanting in moist soil
Soybean, Peanut, Cotton, Sunflower, Maize, Vegetables	Grasses and Annual broad leaf weeds	(200) cc per (16) lit of water	Pre-plant, Pre-transplanting, Pre-emergence