

ဆေးအမည် - ရွှေဆီတာ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Acetamiprid 1.8% EC

ဆေးအာနိသင်

- ရွှေဆီတာပိုးသတ်ဆေးသည် အင်းဆက်၏ အာရုံကြောနှင့် လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်သည့် နီကိုတင်းကို တုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့် နီယိုနီကိုတီနိုက်အုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
- ထိသေ၊ စားသေ၊ ပင်လုံးပျံ့နှင့် ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်အာနိသင်များ ရှိပါသည်။
- ဆေးသည် ဖျက်ပိုး၏ အာရုံကြောစနစ်ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် ဖျက်ပိုး၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များမှ သွေဖယ်ကာ ဖျက်ပိုးကို မူမမှန်စေကာ သေဆုံးစေနိုင်ပါသည်။
- ဖျက်ပိုး အကောင်ကြီးများနှင့် ပိုးလောက်ကောင်များကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အပြင် ဖျက်ပိုးဥများကို ကန့်စေနိုင်သည့် အစွမ်းအာနိသင်များလည်း ရှိပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးဖျန်းပြီး အချိန်တိုအတွင်း ဆေးအာနိသင်ပြသည့်အတွက် ဖျက်ပိုးများကို လျှင်မြန်စွာ နှိမ်နင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- အခြားပိုးသတ်ဆေးများနှင့် တစ်လှည့်စီဖျန်းပေးနိုင်သည့်အတွက် ဖျက်ပိုးများ ပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
- ဖျက်ပိုးများစွာကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းပေးရုံသာမက နို့တိုက်သတ္တဝါနှင့် ငှက်များကို အဆိပ်သင့်မှု အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ရွေးချယ်သင့်သည့် ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
- ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကို သယ်ဆောင်လာသည့် ဖျက်ပိုးများကို နှိမ်နင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။

| အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံများ                        | နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| စပါး                                               | လှေး၊ ဖြုတ်ပိုး၊ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး                                                    |
| မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ | ပျံ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ရွက်ထွင်းရွက်ကပ်ပိုး                             |
| နှမ်း                                              | လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ နှမ်းကျိုင်းနက်၊ ပိုးစေးနှဲ၊ ဖြုတ်ညို (ရွက်စားဖြုတ်ပိုး)၊ နှမ်းဖိုရောဂါ |
| ဝါ                                                 | ပျံ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ မွှားပင့်ကူ                                            |

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်    | ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ရွက်ထွင်းပိုး (ရွက်ကြားပိုး)၊ မွှားပင့်ကူနီ (အစက်နှစ်စက်ပါမွှား)၊ မွှားဝါ(မွှားဖြူ၊ မွှားပင့်ကူနီ) |
| ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ                | ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ကျိုင်းဝါ                                                                           |
| နှင်းဆီ၊ ဂန္ဓမာ                      | လှေး၊ ပျ၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ မွှားပင့်ကူနီ(အစက်နှစ်စက်ပါမွှား)၊ မွှားပင့်ကူ                                                                            |
| မုန်ညင်း၊ မုန်လာမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ | ပျ၊ ယင်ဖြူ၊ ဂေါ်ဖီပျပိုး (မုန်ညင်းပျပိုး)၊ မွှားပင့်ကူနီ                                                                                           |

## သတိပြုရန်

- အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာ၊ အစားအစာများနှင့် ဝေးသောနေရာ၊ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန်။
- ဆေးဖျန်းချိန်နှင့် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုချိန်တွင် သင့်တော်ပြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အဝတ်အစားများ၊ လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
- ဆေးထုတ်တွင် ပါရှိသည့် သုံးစွဲနည်းလမ်း၊ နှုတ်ထားအညွှန်းများကို ဖတ်ရှုပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။

## သုံးစွဲရန်အညွှန်း

| သီးနှံ                                             | နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ                                                                                                               | နှုန်းထား/<br>ရေ (၁၆)<br>လီတာ | အသုံးပြုပုံ                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| စပါး                                               | လှေး၊ ဖြုတ်ပိုး၊ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး                                                                                                                 | ၂၀-၄၀                         | ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန် |
| မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ | ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ရွက်ထွင်းရွက်ကပ်ပိုး                                                                                           | ၂၀-၄၀                         | ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန် |
| နှမ်း                                              | လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ နှမ်းကျိုင်းနက်၊ ပိုးစေးနှံ၊ ဖြုတ်ညို (ရွက်စားဖြုတ်ပိုး)၊ နှမ်းဖိုရောဂါ                                                              | ၂၀-၄၀                         | ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန် |
| ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်                  | ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ရွက်ထွင်းပိုး (ရွက်ကြားပိုး)၊ မွှားပင့်ကူနီ (အစက်နှစ်စက်ပါမွှား)၊ မွှားဝါ(မွှားဖြူ၊ မွှားပင့်ကူနီ) | ၂၀-၄၀                         | ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန် |

|                       |                                                                            |       |                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ | ပျ၊ လေး၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊<br>ဖြုတ်စိမ်း၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ကျိုင်းဝါ | ၂၀-၄၀ | ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံး<br>ပြုရန် |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|

**Name** – Shwe Ceeta

**Active Ingridient** – Acetamiprid 1.8% EC

#### Feature

- Shwe Ceeta belongs to the neonicotinoid class, which mimics nicotine's action in insects.
- A systemic insecticide with translaminar activity, featuring both contact and stomach action.
- It works by interfering with the transmission of nerve impulses in insects, leading to overstimulation and death.
- In addition to effectively controlling the active stages (larvae and adults), it also has ovicidal action.

#### Advantages

- It typically provides quick knockdown of pests, leading to effective control shortly after application.
- It can be used in rotation with other insecticides to manage resistance in pest populations.
- While effective against many pests, it is generally less toxic to mammals and birds, which makes it a preferred choice in many agricultural settings.
- By eliminating the insects that serve as vectors for viral diseases, it also provides protection against those diseases.

| Applicable Crops                           | Target Pests                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paddy                                      | Thrip, Plant hoppers, Rice stem gall midge                                          |
| Blackgram, Mungbean, Legumes and Oil crops | Thrip, Whitefly, Aphid, Bean leaf beetle, Leaf miner and binder                     |
| Sesame                                     | Thrip, Whitefly, Sesamum Black Beetle, Mealybug, Brown planthopper, Sesame phyllody |

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotton                                         | Aphid, Whitefly, Thrip , Leafhopper, Spider mite                                                                                                   |
| Tomato, Chili & Pepper, Potato, Onion & Garlic | Aphid, Thrip, Whitefly, Leafhopper, Tomato leaf miner, Potato leaf miner, Red spider mite (two-spotted spider mite), Yellow mite (red spider mite) |
| Cucurbit, Pumpkin, Cucumber, Watermelon        | Aphid, Thrip, Whitefly, Leafhopper, Leaf beetle, Leaf miner, Flea beetle                                                                           |
| Brassicae crops                                | Cabbage aphid (Mustard aphid), Whitefly, Leaf miner, Red spider mite                                                                               |
| Chrysanthemum, Rose                            | Thrip, Aphid, Whitefly, Leaf miner, Scale insects, Red spider mite (two-spotted spider mite), Spider mite                                          |

### Caution

- Store in a cool, dry place away from sunlight, food and out of reach of children.
- Always wear appropriate PPE (Personal Protective Equipment), including gloves, masks, and protective clothing, to minimize exposure during handling and application
- Always read and follow the manufacturer's label instructions for specific application rates, methods, and safety information.

### Uses and Recommendations

| Crop                                           | Target Pests                                                                        | Dosage/<br>(16) Lit | Method |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Paddy                                          | Thrip, Plant hoppers, Rice stem gall midge                                          | 20-40               | Spray  |
| Blackgram, Mungbean, Legumes and Oil crops     | Thrip, Whitefly, Aphid, Bean leaf beetle, Leaf miner and binder                     | 20-40               | Spray  |
| Sesame                                         | Thrip, Whitefly, Sesamum Black Beetle, Mealybug, Brown planthopper, Sesame phyllody | 20-40               | Spray  |
| Tomato, Chili & Pepper, Potato, Onion & Garlic | Aphid, Thrip, Whitefly, Leafhopper, Tomato leaf miner, Potato leaf miner,           | 20-40               | Spray  |

|                                            |                                                                             |       |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                            | Red spider mite (two-spotted spider mite), Yellow mite (red spider mite)    |       |       |
| Cucurbit, Pumpkin,<br>Cucumber, Watermelon | Aphid, Thrip, Whitefly, Leafhopper,<br>Leaf beetle, Leaf miner, Flea beetle | 20-40 | Spray |