

ဆေးအမည် - ရွှေမီဆိုကွန်း

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Mesotrione 15% SC

ဆေးအာနိသင်

- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ရွက်ပြန့်ပေါင်းများနှင့် အချို့သောမြက်များ ပေါင်းမပေါက်မီနှင့် ပေါင်းပေါက်ပြီးချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော ပြောင်းရွှေ့ချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးကို ပေါင်းပင်၏ အမြစ်နှင့် အရွက်များမှ စုပ်ယူပြီး အစာရေကြောစီးအတွင်း အထက်အောက်ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ပေါင်းပင်၏ အစာချက်လုပ်မှုကို နှောင့်ယှက်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့် အရွက်များ အဖြူရောင်ပြောင်းသွားပြီး တဖြည်းဖြည်းသေစေပါသည်။
- အထူးသဖြင့် ပြောင်းခင်းအတွင်းရှိ တစ်နှစ်ခံရွက်ပြန့်ပေါင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ပေါင်းပင်မှ လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်သည့်အတွက် ဆေးဖျန်းပြီးသည့်အချိန် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းစေပါသည်။
- အခြားသောပေါင်းသတ်ဆေးများနှင့် တွဲသုံးခြင်းအားဖြင့် အာနိသင်ထိရောက်မှုကို ပိုကောင်းစေပါသည်။

သတိပြုရန်

- ပေါင်းသတ်ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- ချဉ်းကိန်း (၅ - ၇) အတွင်းရှိသောရေကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆေး၏အာနိသင်ကို ထိရောက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
- အော်ဂဲနိုဖော့စဖောရပ်စ် (သို့) ကာဘမိတ်အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အနည်းဆုံး (၇) ရက်ခြား၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်းများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ပြောင်း	ရွက်ပြန်ပေါင်းနှင့် အချို့သောမြက်များ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၈၀) စီစီ	ပေါင်းရွက် (၂-၃) ရွက်ထွက်ချိန်

Name - Shwe Meso Corn

a.i - Mesotrione 15% SC

Product Feature

- It is systemic, selective pre- and post- emergence control of broad leaf weeds and some grasses in maize.
- It is absorbed by roots and foliage, translocated through xylem and phloem.
- As it disrupts the photosynthesis, the leaves of weeds gradually turn white and eventually die.
- Especially, it can effectively control annual broadleaf weeds in maize.

Advantages

- It has quick absorption by plants, reducing the risk of reduced the efficacy due to rainfall shortly after application.
- It has compatibility with a variety of tank mixes, improving effectiveness when combined with other herbicides.

Caution

- If possible, herbicide should be diluted only with clean, uncontaminated water.
- It is essential that the water used has a pH level between 5 and 7 to ensure optimal effectiveness and to prevent potential degradation of the herbicide.
- This herbicide should be used at least (7) days interval with any organophosphorus or carbamate pesticides.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage	Method/ Applicable Time
Maize	Broad leaf weeds and Some grasses	(50-80) cc per (16) L of water	(2-3) leaf stage of weeds