

ဆေးအမည် - မက်ဂါပါရာ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Paraquat 27.6% SL

ဆေးအာနိသင်

- ဆေးအာနိသင် တုန့်ပြန်မှု လျင်မြန်ပြီး ထိသေရွေးချယ်မှုအာနိသင်ရှိသော ဘက်စုံသုံး ပေါင်းသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ပေါင်းပင်၏ အညွန့်အရွက်များမှ ဆေးကို စုပ်ယူသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ဆေးအာနိသင်သည် နေရောင်ခြည်နှင့် ဓာတ်ပြုပြုကွဲပြီးမှ ပေါင်းပင်ကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
- ပေါင်းပင်၏ တစ်သျှူးများကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးခြင်းအားဖြင့် အရွက်များကို ညှိုးခြောက်ကာ သေစေပါသည်။
- ရွက်ပြန့်ပေါင်းများနှင့် မြက်အုပ်စုဝင်ပေါင်းများကို လျင်မြန်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးအာနိသင်ထိရောက်မှုလျင်မြန်သည့်အတွက် ပေါင်းများကို လျင်လျင်မြန်မြန် နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းပြီးချိန် နေရောင်ခြည် ကောင်းစွာ ရရှိပါက (၁-၂) နာရီအတွင်း ဆေးထိရောက်မှုကို ပြနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။

သတိပြုရန်

- ပေါင်းသတ်ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- ချဉ်းကိန်း (၅.၅-၆) အတွင်းရှိသောရေကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆေး၏အာနိသင်ကို ထိရောက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ပေါင်းများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
သီးနှံမစိုက်ခင် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ	မြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀၀) စီစီ	မြေယာမပြုပြင်မီ (၂၀- ၃၀) ရက်ခွာ၍ အသုံးပြုပါ။
ဝါ၊ ကြံ၊ ကော်ဖီ၊ ရာဘာ၊ ပြောင်း၊ စပျစ်၊ နာနတ်၊ ငရုတ်၊ အလူး	မြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀၀-၁၅၀) စီစီ	သီးနှံအပင်ပေါက်ပြီး (၃၀) ရက်သားတွင် တန်းကြားတွင် အသုံးပြုရန်

Name - Mega Para

a.i - Paraquat 27.6% SL

Product Feature

- It is a fast-acting, non-selective, contact herbicide.
- It is absorbed by the foliage.
- Primarily, it has the ability to attack weeds after being reactively decomposed by sunlight.
- It destroys the plant tissue by disrupting the photosynthesis and rupturing cell membranes, which allows water to escape leading to rapid desiccation of foliage.
- It is used for controlling broadleaf weeds and grasses.

Advantages

- As the product is fast-acting, it can control the weed quickly.

- If the broad leaf weeds and grasses receive good sunlight after spraying, it has the ability to show efficacy within (1-2) hours.

Caution

- If possible, herbicide should be diluted only with clean, uncontaminated water.
- It is essential that the water used has a pH level between 5.5 and 6 to ensure optimal effectiveness and to prevent potential degradation of the herbicide.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage	Method/ Applicable Time
No-till farming	Grasses and Broad leaf weeds	(200) cc per (16) L of water	(20-30) days before land preparation
Cotton, Sugarcane, Coffee, Rubber, Maize, Grape, Pineapple, Chili, Potato	Grasses and Broad leaf weeds	(100-150) cc per (16) L of water	To be used between the rows at (30) days after crop seedling