

ဆေးအမည် - မက်ဂါဘွန်ဇိုင်း

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Acetamiprid 10.5% + Beta-Cypermethrin 5% WP

ဆေးအာနိသင်

- မက်ဂါဘွန်ဇိုင်းပိုးသတ်ဆေးသည် ဖျက်ပိုးများစွာကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး နီယိုနီကိုတီနိုက်အုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဆေးဂန္ဓမာအုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးနှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- ထိသေ၊ စားသေ၊ ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်နှင့် ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်နိုင်သည့် အာနိသင်များ ရှိပါသည်။
- ဖျက်ပိုး၏ အာရုံကြောစနစ်ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပြီး လျှင်မြန်စွာ ဖျက်ပိုး၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်တန့်စေကာ အကြောဆွဲ၍ သေစေနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- စုပ်စား၊ ကိုက်စားဖျက်ပိုးများ၊ လှေးအုပ်စုဝင်ဖျက်ပိုးများ၊ လိပ်ပြာဖလံအုပ်စုဝင် ပိုးလောက်ကောင်များ၊ ကျိုင်းကောင်အုပ်စုဝင် ဖျက်ပိုးများ၊ တောင်ပံနှစ်စုံပါရှိသည့် ခြင်၊ ယင်အုပ်စုဝင် ဖျက်ပိုးများ၊ ဖြုတ်စိမ်းများနှင့် အကြေးပိုးအုပ်စုဝင် ဖျက်ပိုးများ အစရှိသည့် ဖျက်ပိုးများစွာကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- ဖျက်ပိုးများကို အချိန်တိုအတွင်း လျှင်မြန်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ဆေးအာနိသင် ကြာရှည်ခံပါသည်။
- ဆေးနှုန်းထား အနည်းငယ်ဖြင့် ဖျက်ပိုးများစွာကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်သောကြောင့် စီးပွားရေးအရ တွက်ချေကိုက်စေပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံများ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ
စပါး	စပါးဆစ်ပိုး၊ လှေး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ စပါးရွက်ကပ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်အိမ်ပိုး
ပြောင်း	ငမြောင်တောင် (ဆိတ်တို့ကောင်)၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ဥနီရွက်စားပိုး
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ၊ အစက်အပြောက်ပါသီးလုံးဖောက်ပိုး(ပွင့်ထွေးပိုး)၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ခူမွေးရှည်၊ ဥနီရွက်စားပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ပင်စည်ထိုးယင်
နှမ်း	လှေး၊ နှမ်းကျိုင်းနက်၊ နှမ်းရွက်လိပ်ပိုး(သီးလုံးဖောက်ပိုး)၊ ခူမွေးရှည်၊ ငမြောင်တောင်၊ ပိုးစေးနှဲ
ဝါ	ပျ၊ လှေး၊ ဝါသီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပန်းရောင်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ အစက်အပြောက်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ဝါရွက်လိပ်ပိုး၊ ဥနီရွက်စားပိုး၊ မွှားပင့်ကူ၊ ဖြုတ်စိမ်း

ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်	ပျ၊ လှေး၊ အစက်အပြောက်ပါသီးလုံးဖောက်ပိုး(ပွင့်ထွေးပိုး)၊ ဥနီရွက်စားပိုး၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ရွက်ဖြတ်ပိုး၊ ဝိုင်ယာပိုး (အမျှင်ပိုး)၊ ငမြောင်တောင် (ဆိတ်တို့ကောင်၊ ထွာကောင်စိမ်း) ၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း၊ မွားဝါ(မွားဖြူ၊ မွားပင့်ကူနီ)၊ မွားပင့်ကူနီ (အစက်နှစ်စက်ပါမွား)၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ကြက်သွန်နီယင်
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ	ပျ၊ လှေး၊ ရွှေဖရုံခူကောင်၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ကျိုင်းဝါ၊ ကျိုင်းနီ၊ ထွာကောင်စိမ်း၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ သီးထိုးယင်
နှင်းဆီ၊ ဂန္ဓမာ	လှေး၊ ပျ၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ငမြောင်တောင် (အဖူးပိုး)၊ မွားပင့်ကူနီ (အစက်နှစ်စက်ပါမွား)၊ အကြေးပိုး
မုန်ညင်း၊ မုန်လာမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ	ပျ၊ ယင်ဖြူ၊ ရွက်ထွေးပိုး၊ ဆေးရွက်ကြီးခူကောင်၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ စိန်ကွက်ဖလံ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်ထိုးပိုး၊ ရွက်ထွေးပိုး၊ ကျိုင်းဝါ၊ ဂေါ်ဖီပျပိုး (မုန်ညင်းပျပိုး)

သတိပြုရန်

- အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန်။
- ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် ထားသိုရန်။
- သီးနှံပန်းပွင့်ချိန်၊ ပူပြင်းသောအချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါက ပန်းပွင့်ဝတ်မှုခံအိတ်နှင့် ဝတ်မှုကူးရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ပျား၊ပိတုန်းများကို ထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်သည့်အတွက် ယင်းအချိန်တွင် ဆေးသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ	နှုန်းထား/ ရေ (၁၆) လီတာ	အသုံးပြုပုံ
စပါး	စပါးဆစ်ပိုး၊ လှေး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ စပါးရွက်ကပ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်အိမ်ပိုး	၂၀-၄၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ပြောင်း	ငမြောင်တောင် (ဆိတ်တို့ကောင်)၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ဥနီရွက်စားပိုး	၂၀-၄၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ပျ၊ လှေး၊ အစက်အပြောက်ပါသီးလုံးဖောက်ပိုး(ပွင့်ထွေးပိုး)၊ ပင်ဖြတ်ပိုး၊ ပွင့်ထွေးပိုး	၂၀-၄၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်

	ခုမွေးရည်၊ ဥနီရွက်စားပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ပင်စည်ထိုးယင်		
မုန်ညင်း၊ မုန်လာမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ	ပျ၊ ရွက်ထွေးပိုး၊ ဆေးရွက်ကြီးခုကောင်၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ စိန်ကွက်ဖလံ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်ထိုးပိုး၊ ရွက်ထွေးပိုး၊ ကျိုင်းဝါ၊ ဂေါ်ဖီပျပိုး (မုန်ညင်းပျပိုး)	၂၀-၄၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံး ပြုရန်
ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်	ပျ၊ လှေး၊ အစက်အပြောက်ပါသီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ပွင့်ထွေးပိုး၊ ဥနီရွက်စားပိုး၊ ရွက်ဖောက်ကျိုင်း၊ ရွက်ဖြတ်ပိုး၊ ပိုင်ယာပိုး (အမျှင်ပိုး)၊ ငမြောင်တောင် (ဆိတ်တို့ကောင်၊ ထွာကောင်စိမ်း) ၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း၊ မွှားဝါ(မွှားဖြူ၊ မွှားပင့်ကူနီ)၊ မွှားပင့်ကူနီ (အစက်နှစ်စက်ပါမွှား)၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ကြက်သွန်နီယင်	၂၀-၄၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံး ပြုရန်

Name – Mega Bonsi

Active Ingridient – Acetamiprid 10.5% + Beta-Cypermethrin 5% WP

Product Feature

- It has broad-spectrum activity, combining two insecticide groups: neonicotinoids and pyrethroids.
- A systemic insecticide with translaminar activity, featuring both contact and stomach action.
- It disrupts the nervous system of insects, causing paralysis and a quick knockdown.

Advantages

- As a broad-spectrum insecticide, it is widely used to control piercing-sucking insects, as well as those from the orders Thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, and Homoptera.

- It provides quick control of pests and ensures longer-lasting effects.
- Users can apply this insecticide at a low dosage to effectively control pests, making it a cost-effective option.

Applicable Crops	Target Pests
Paddy	Stem borer, Thrip, Leaf folder, Rice caseworm, Rice skipper
Maize	Fall armyworm (Rice Ear Cutting Caterpillar), Black cutworm, Beet armyworm, Cotton bollworm
Blackgram, Mungbean	Thrip, Aphid, Hairy caterpillar, Beet armyworm, Bean leaf beetle, Spotted pod borer, Gram Pod Borer, Common Cutworm, Tobacco Caterpillar (Cutworm), Bean leaf roller, Bean stem fly
Sesame	Thrip, Sesamum Black Beetle, Fall armyworm, Hairy caterpillar, Leaf webber (Roller and capsule borer), Mealybug
Cotton	Aphid, Thrip, American bollworm, Pink bollworm, Spotted bollworm, Cotton leaf roller, Leafhopper
Tomato, Chili & Pepper, Potato, Onion & Garlic	Aphid, Thrip, African Cotton Bollworm (Tomato fruitworm), Egyptian cotton leafworm, Wireworm, Beet armyworm, Tomato leaf miner, Gram caterpillar, Tobacco cutworm, Potato tuber moth, Onion thrip, White grub, Leafhopper, Onion fly, Red spider mite (Two-spotted spider mite)
Cucurbit, Pumpkin, Cucumber, Watermelon	Flea beetle, Red beetle, Leaf miner, Pumpkin caterpillar, Semi-looper, Aphid, Thrip, Fruit fly, Leafhopper
Brassicae crops	Diamond back moth, Cabbage borer, Leaf webber, Green semi-looper, Tobacco caterpillar, Cabbage aphid (Mustard aphid), Flea beetle, Leaf miner, Fall armyworm
Chrysanthemum, Rose	Thrip, Aphid, Fall armyworm, Leaf miner,

	Red spider mite (Two-spotted spider mite), Spider mite
--	--

Caution

- It should be stored in a cool, dry place, away from sunlight.
- Kept out of reach of children.
- Avoid application during high temperatures and flowering periods to minimize damage to the stigma and protect pollinators.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage/ (16) Lit	Method
Paddy	Stem borer, Thrip, Leaf folder, Rice caseworm, Rice skipper	20-40	Spray
Maize	Faw armyworm (Rice Ear Cutting Caterpillar), Black cutworm, Beet armyworm, Cotton bollworm	20-40	Spray
Blackgram, Mungbean	Thrip, Aphid, Hairy caterpillar, Beet armyworm, Bean leaf beetle, Spotted pod borer, Gram Pod Borer, Common Cutworm, Tobacco Caterpillar (Cutworm), Bean leaf roller, Bean stem fly	20-40	Spray
Brassicae crops	Diamond back moth, Cabbage borer, Leaf webber, Green semi-looper, Tobacco caterpillar, Cabbage aphid (Mustard aphid), Flea beetle, Leaf miner, Faw armyworm, Whitefly	20-40	Spray
Tomato, Chili & Pepper, Potato, Onion & Garlic	Aphid, Thrip, African Cotton Bollworm (Tomato fruitworm), Egyptian cotton leafworm, Wireworm, Beet armyworm, Tomato leaf miner ,	20-40	Spray

	Gram caterpillar, Tobacco cutworm, Potato tuber moth, Onion thrip, Yellow mite (Red spider mite), Red spider mite (Two-spotted spider mite), Leafhopper, Onion fly		
--	--	--	--