

ဆေးအမည် - ရွှေစိုမော့

အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Azoxystrobin 15% + Dimethomorph 55% WDG

ဆေးအာနိသင်

- ကာကွယ်၊ ကုသ၊ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ဆေး ဖြစ်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းလိုက်သည်နှင့် အရွက်မျက်နှာပြင်တစ်ဘက်သို့ ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်သွားနိုင်ရုံသာမက တစ်ပင်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့စိမ့်ဝင်သွားနိုင်သည့် အာနိသင်ရှိသည်။
- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး မှိုစပိုးထုတ်မှု၊ မှိုစပိုးများ မျိုးညှောင့်ပေါက်မှုနှင့် မှိုမျှင်ကြီးထွားပွားများမှုကို ဟန့်တားပေးပါသည်။
- မှိုရောဂါများစွာကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သော အာနိသင်ရှိပါသည်။
- ဆေးအနည်းငယ်သုံးရုံနှင့် ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်သည်။
- သီးနှံများတွင် ကျရောက်တတ်သော ခါးရို၊ အမြစ်ပုပ်၊ အစေ့ပုပ်၊ နှောင်းပင်နာကျ၊ စောပင်နာကျ၊ တောက်တွဲမြီး၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်ရောဂါများအတွက်အထူးနှိမ်နင်းပေးနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်အာနိသင်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အရွက်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးကို မှိုရောဂါများ ဖြစ်စေခြင်းမှ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- မှိုရောဂါများကို ကြာရှည်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အာနိသင်ရှိသည့်အတွက် မှိုသတ်ဆေးများကို ခဏခဏ အသုံးမပြုရဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
- အခြားမှိုသတ်ဆေးများနှင့် မနိုင်သော ရောဂါများကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါ
စပါး	ဂုတ်ကျိုး
ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ	သံချေး၊ ခါးရို
ကွမ်း	ဒေါင်းမြီးကွက်/ဒဂီးကွက်၊ ပင်ခြေပုပ်၊ ပင်ညှိုး
ကြက်သွန်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ဖားဥမှို၊ တောက်တွဲမြီး
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ဖားဥမှို
စပျစ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ သီးခိုင်ပုပ်၊ အညှာပုပ်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	နှောင်းပင်နာကျ၊ စောပင်နာကျ၊ ဖိုက်တိုဖဆိုရာပင်ညှိုး၊ ချေးဖတ်၊ ခါးရို
ငရုတ်	ကိုင်းဖျားခြောက်၊ ဖိုက်တိုဖဆိုရာပင်ညှိုး၊ ခါးရို
ဂန္ဓမာ	သံချေးဖြူ
ရာဘာ	အခေါက်ပုပ်၊ ရာဘာရွက်ခြောက် (အပင်ကြီး၊ ကိုင်းကူးပင်)

သတိပြုရန်

- ဆေးများဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသောအချိန်၊ လေပြင်းထန်စွာ တိုက်သောအချိန်များတွင် အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
- အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပြီး အခြားသော အာနိသင်များရှိသည့် မှိုသတ်ဆေးများနှင့် တစ်လှည့်စီခြား၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ဖားဥမှို၊ တောက်တွဲမြီး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်
စပျစ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ဖားဥမှို၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	နှောင်းပင်နာကျ၊ စောပင်နာကျ၊ ဖိုက်တိုဖဆိုရာပင်ညှိုး၊ ခါးရိ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်
ငရုတ်	ကိုင်းဖျားခြောက်၊ ဖိုက်တိုဖဆိုရာပင်ညှိုး၊ ခါးရိ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်
ကွမ်းရွက်	ဒေါင်းမြီးကွက်ရောဂါ၊ ပင်ခြေပုပ်၊ ပင်ညှိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်

Name - Shwe Zo Morph

a.i - Azoxystrobin 15% + Dimethomorph 55% WDG

Product Feature

- It has excellent protective having additional curative and eradicated.
- When sprayed, it not only has translaminal action of both sides of leaf but also has the translocation through the plant.
- It is systemic and inhibits sporogenesis, spore germination, and hyphal invasion at the same time.
- It is a broad spectrum fungicide.
- It can be effectively controlled by just using a few dose of product.

- It is a fungicide that should be specially controlled for the damping off, root rot, seed rot, late blight, early blight, purple blotch, downy mildew.

Advantages

- It penetrates leaf surfaces, ensuring protection on both sides of the leaf.
- It minimizes the need for repeated fungicide application by providing prolonged protection.
- It can effectively control diseases that cannot be controlled by other fungicides.

Applicable Crops	Target Pests
Paddy	Blast
Pea & Bean, Oil seed crop	Rust, Damping-off
Betel vine	Phytophthora leaf spot, Phytophthora foot rot, Sclerotium wilt
Onion & Garlic	Downy mildew, Powdery mildew, Purple blotch
Cucurbit, Pumpkin, Cucumber, Watermelon	Downy mildew, Powdery mildew
Grape	Downy mildew, Powdery mildew, Anthracnose
Tomato, Potato	Late blight, Early blight, Phytophthora wilt, Scab, Damping-off
Chilli & Pepper	Die-back, Phytophthora wilt, Damping-off
Chrysanthemum	White rust
Rubber	Black stripe and stem cracking, Leaf blight of mature rubber tree and budded seedlings

Caution

- Should be avoided application during adverse weather conditions (e.g- heavy rain, strong winds) to prevent runoff and drift.
- Should be avoided the repeated use of the product, rotated with other fungicides having different modes of action.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage
Onion & Garlic	Downy mildew, Powdery mildew, Purple blotch	(10-20) g per (16) L of water
Grape	Downy mildew, Powdey mildew, Anthracnose	(10-20) g per (16) L of water
Tomato, Potato	Late blight, Early blight, Phytophthora wilt, Scab, Damping-off	(10-20) g per (16) L of water
Chilli & Pepper	Die-back, Phytophthora wilt, Damping-off	(10-20) g per (16) L of water
Betel vine	Phytophthora leaf spot, Phytophthora foot rot, Sclerotium wilt	(10-20) g per (16) L of water