

ဆေးအမည် - မက်ဂါ ခရုဇာ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Trifloxystrobin 25 % + Tebuconazole 50 % WDG

ဆေးအာနိသင်

- မှိုသတ်ဆေးဖြစ်သည့်အပြင် အပင်ဟော်မုန်းအာနိသင်ပါ ရှိပြီး သီးနှံမျိုးစုံတွင် ကျရောက်သော မှိုရောဂါမျိုးစုံကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး မှိုမျှင်၊ မှိုစပိုင်းများ၏ အသက်ရှူမှုနှင့် အောက်ဆီဂျင် ရရှိမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။
- ရောဂါများကို ကာကွယ်၊ ကုသ၊ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်သည့် အာနိသင်ရှိပြီး အပင်အစိတ်အပိုင်းများမှ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူကာ ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်အာနိသင်နှင့် အပင်အတွင်း အောက်မှ အထက်သို့ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ဘက်တီးရီးယားရောဂါများကိုလည်း ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်သည့်အပြင် အပင်ပေါ်တွင် ဆေးအာနိသင်ကိုလည်း ကြာရှည်ခံစေပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- မှိုမျှင်၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးတည်းကို မဟုတ်ဘဲ နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပေးသည့်အတွက် မှိုရောဂါများ ဆေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ကောင်းစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံရောဂါများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ရုံသာမက စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုကိုပါ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
- သီးနှံအထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကိုပါ ထူးခြားကောင်းမွန်စေပါသည်။
- ဆေးနှုန်းထားအနည်းငယ် အသုံးပြုရုံဖြင့် မှိုရောဂါမျိုးစုံကို အချိန်တိုအတွင်း သိသိသာသာနှင့် ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။

သတိပြုရန်

- အာနိသင်ထိရောက်မှု လျော့နည်းတတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆေးအသုံးပြုပြီး (၁) နာရီအတွင်း မိုးလွှတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ဂုတ်ကျိုး၊ မှိုသီး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ငရုတ်	မဲ့ပြောက်စွန်း/ အသီးပုပ်/ ကိုင်းဖြားခြောက်/ ဖလံဖြူရောဂါ၊ ဖားဥမှို၊ စာကိုစပိုင်းရားရွက်ပြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်

ခရမ်းချဉ်	စောပင်နာကျ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ကြက်သွန်	တောက်တဲ့မြီး၊ လည်လိမ်/ဂျိုလိမ်၊ ပင်ခြေပုပ်/ဥပုပ်ခေါင်းပုပ်၊ မှိုမဲ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
စပျစ်၊ သရက်	ဖားဥမှို၊ မွဲပြောက်စွန်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
မြေပဲ	စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်/စောရွက်စက်ပြောက်၊ နှောင်းရွက်စက်ပြောက်၊ ပင်ခြေပုပ်၊ ခါးရီ/မြစ်ပုပ်ရောဂါ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်

Name - Mega Cruiser

a.i - Trifloxystrobin 25 % + Tebuconazole 50 % WDG

Product Feature

- It is a fungicide and plant growth regulator used to control fungal diseases in a variety of crops.
- It is broad spectrum, systemic fungicide that interferes the respiration and cell walls of fungi.
- It has protective, curative and eradicated action, rapidly absorbed into the vegetative parts of the plant, with translocation principally acropetally.
- It also has high bactericidal activity, and long lasting effect.

Advantages

- It has multi-site activity, so it is excellent for resistance management program.
- It provides stress tolerance to crops against biotic and abiotic factors (like drought, salt, heat and chilling stress).
- It enhances yield and quality.

- It can be effectively controlled broad spectrum fungal diseases by using a small amount of dose.

Precautions

- Since the effectiveness of the herbicide is reduced, it is crucial that it does not rain within (1) hour after using the product.

Uses and Recommendations

Crops	Target Pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Sheath blight, Blast, False smut	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease
Chilli	Anthrachnose/ Fruit rot and Die back, Powdery mildew, Cercospora leaf spot	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease
Tomato	Early blight	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease
Onion	Purple blotch, Anthracnose, Basal rot, Black mold	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease
Grape, Mango	Powdery mildew, Anthracnose	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease
Peanut	Early leaf spot, Late leaf spot, Collar rot, Damping-off/ Root rot	(10-20) g per (16) L of water	Apply at the early stage of the disease