

ဆေးအမည် - ရွှေသီယာမင်း

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Bismethiazol 20% WP

ဆေးအာနိသင်

- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်သော ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်ကွဲပွားများနှင့် ပျံ့ပွားမှုများကို ဟန့်တားပေးနိုင်သည်။
- ဆေးသည် စပါးပင်၏ ပိုးမွှားမျိုးစုံအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းထားလျှင် အပင်ပေါ်တွင် ဆေးအာနိသင် (၁၀-၁၄) ရက်ထိ ကြာရှည်ခံပါသည်။
- စပါးဘက်တီးရီးယားရောဂါများကို အထူးနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- မိုးရေဖြင့် အလွယ်တကူ မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
- ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပျော့ပုပ်ရောဂါများကို အမြစ်ပြတ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပြီး သီးနှံပင်ကျန်းမာအထွက်တိုးစေပါသည်။
- သီးနှံပင်၏ သဘာဝအတိုင်း ပိုးမွှားရောဂါများကိုခုခံနိုင်စွမ်းရည်ကို တိုးစေပါသည်။

သတိပြုရန်

- မိုးရွာသောအချိန်နှင့် လေတိုက်သောအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုပါက အာနိသင်ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။
- အပူချိန်မြင့်သောအချိန် သို့ နေရောင်ခြည်ပြင်းသော အချိန်များတွင် အသုံးပြုပါက သီးနှံပင်အားဆေးလောင်နိုင်ပါသည်။
- အက်စစ် သို့ အယ်ကာလီဓာတ်ပါဝင်သော ဆေးများ သို့ မြေဩဇာများနှင့် ရောစပ်၍ အသုံးမပြုသင့်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်၊ ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန် (သို့) အစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ပဲမျိုးစုံ	ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန် (သို့) အစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်

ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ မုန်ညင်းမုန်လာပင်များ	ဘက်တီးရီးယား ရွက်ပြောက်၊ ဘက်တီးရီးယားပင်ညှိုး၊ ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀) ဂရမ်	ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန် (သို့) အစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
--	---	-----------------------------------	--

Name - Shwe Thiyar Min

a.i - Bismethiazol 20% WP

Product Feature

- It is systemic fungicide and bactericide with preventive and curative action.
- It inhibits bacterial cell division, preventing the spread of infection.
- In addition to its direct antibacterial effects, it helps plants enhance their own immune response against pathogens, offering broader disease resistance.
- It has long lasting effect up to 10-14 days.
- Especially, it effectively controls bacterial diseases.

Advantages

- It cannot washed away by rain.
- It highly effective against bacterial blight and soft rot, leading to healthier crops and improved yields.
- It can boost plants' natural defense mechanisms.

Precaution

- It may be washed off by rain or dispersed by the wind, reducing its effectiveness.
- High temperatures or strong sunlight conditions can cause phytotoxicity.
- You should avoid mixing bismethiazol with strong acidic or alkaline pesticides or fertilizers.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
------	--------------	--------	---------------------------------------

Paddy	Bacterial Leaf Blight, Bacterial Leaf Streak	(50) g per (16) L of water	Apply at the initial or early stage of disease
Legumes	Common Blight, Bacterial Leaf Blight	(50) g per (16) L of water	Apply at the initial or early stage of disease
Chili, Tomato, Brassica crops	Bacterial leaf spot, Bacterial spot, Bacterial wilt, Black rot	(50) g per (16) L of water	Apply at the initial or early stage of disease