

ဆေးအမည် - ရွှေမီသိုမော့ဖ်/ မက်ဂါဒီမို

အစွမ်းရှိအစွန်း(a.i) - Dimethomorph 50% WP

ဆေးအာနိသင်

- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး ကာကွယ်ကုသဆေးဖြစ်သည်။
- အပင်တစ်သျှူးများမှ ဆေးအားစုပ်ယူပြီး အပင်၏ အညွန့်အတက်များအထိ ရောဂါကျရောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- မှိုမျှင်ကြီးထွားပွားများမှုကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
- အခြားဆေးများနှင့်လည်း တွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် ဆေးခဏခဏဖျန်းစရာမလိုဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
- ဆေးဖျန်းသည့်နေရာတွင်သာမက အပင်တစ်ပင်လုံးကိုပါ ရောဂါကျရောက်မှုမှ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးနှုန်းထားအနည်းငယ် အသုံးပြုရုံဖြင့် ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်၊ ခရမ်း၊ ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ မုန်ညင်းမုန်လာပင်များ၊ ဗူး၊ ဖရုံ၊ သခွားအုပ်စုဝင်အပင်များ	နှောင်းပင်နာကျ/လောင်၊ ပန်းရောင်ပျော့ပုပ်၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ အမြစ်ပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
စပျစ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
နှမ်း	ဖိုက်တိုဖိုသိုရာရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

ကွမ်း	ဒေါင်းမြီးကွက်/ဒဂီးကွက်၊ ပင်ခြေပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ရုဘာ	အခေါက်ပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Methomorph

a.i - Dimethomorph 50% WP

Product Feature

- It is systemic, protective and curative fungicide.
- It is absorbed by plant tissues and translocated to protect new growth.
- It disrupts the growth and development of fungi especially oomycetes.
- It is compatible with many other fungicides for tank mixing.

Advantages

- Its long-lasting control reduces the need for frequent applications and costs.
- It allows it to provide protection not only at the site of application but also in other parts of the plant that may not have been directly sprayed.
- It can be effectively control by using small dosage.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
------	--------------	--------	---------------------------------------

Potato, Tomato, Chilli & pepper, Eggplant, Onion & Garlic, Brassica crops, Cucurbits	Late blight, Pink rot, Downy mildew, Crown rot and root rot	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of the disease
Grapes	Downy mildew	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of the disease
Sesame	Phytophthora blight	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of the disease
Betel vine	Phytophthora leaf spot, Phytophthora foot rot	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of the disease
Rubber	Black stripe and stem cracking	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of the disease