

ဆေးအမည် - ရွှေနီကိုးလ်

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Difenoconazole 10% WG

ဆေးအာနိသင်

- ထရိုင်ရာဇီးအုပ်စုဝင် ပင်လုံးပြန့်ပွားမှုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- အပင်၏ အရွက်တစ်သျှူးများမှ စုပ်ယူထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်ပြီး ရေကြောစည်းမှတစ်ဆင့် တစ်ပင်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ဖြင့် ကာကွယ်၊ ကုသ၊ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ဆေးဖြစ်သည်။
- မှိုမျှင်များပုံပျက်စေခြင်း၊ မှိုဆဲလ်များသေခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး မှိုမျိုးစေ့(စပိုင်း) မျိုးညှောင့်ပေါက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါသည်။
- ဆေးကို မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး၊ ဖျန်းဆေးအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အခြားမှိုသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်လည်း ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံပင်မှ လျင်မြန်စွာစုပ်ယူသည့်အတွက် အသုံးပြုပြီး မိုးရေကြောင့် အာနိသင်ဆုံးရှုံးမှုကို နည်းစေပါသည်။
- ကြာရှည်စွာ ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် အကြိမ်များစွာ ဆေးအသုံးပြုစရာ မလိုပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ဂျုံ	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ပင်စည်ပုပ်၊ မှိုသီး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
မြေပဲ၊ နှမ်း	ရွက်ပြောက်၊ ပင်ခြေပုပ်၊ ခါးရိ/မြစ်ပုပ်၊ သံချေး၊ နှမ်းရိုးမဲ/ရိုးချောင်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ပဲမျိုးစုံ	သံချေး၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ ဖျူစေရီယမ်ပင်ညှိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်	စောပင်နာကျ၊ အမြစ်ပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊

			ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ဝါ	ခါးရို၊ ပင်ညှိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်း ကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
စပျစ်၊ ဗူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဂေါ်ဖီ	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်း ကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Nocole

a.i - Difenoconazole 10% WG

Product Feature

- It is systemic broad-spectrum trazole fungicide.
- It is absorbed by plant tissues and moves translaminarly (across the leaf) and systemically through the vascular system.
- This systemic activity provides protective, curative and sometime eradivative properties.
- It causes abnormal fungal growth, death of the fungal cell and inhibits spore germination.
- It acts as a seed treatment and foliar spray.

Advantages

- It can be used by mixing with other fungicides and insecticides.

- It is quickly absorbed by plants and remains resistant to being washed off by rain after application.
- It can offer extended periods of control, reducing the need for frequent applications.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy, Wheat	Sheath blight, Stem rot, False smut	(10 – 20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Peanut, Sesame	Leaf spot, Collar rot, Damping-off and Root rot, Rust, Stem and Root Rot/ Chacoral Rot	(10-20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Legumes	Dry bean rust, Anthracnose, Fusarium wilt	(10-20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Potato, Tomato	Early blight, Root rot	(10-20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Cotton	Damping-off, Wilt	(10-20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Grapes, Cucurbits, Cabbage	Powdery mildew, Downy mildew	(10-20) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease