

ဆေးအမည် - ရွှေနီဝင်း

အစွမ်းရှိပစ္စည်း - Azoxystrobin 25% SC

ဆေးအာနိသင်

- ရောဂါများကို ကာကွယ်၊ ကုသ၊ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- သီးနှံပင်အစိတ်အပိုင်းများမှ ဆေးအား လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူပြီး အပင်အတွင်း အောက်မှ အထက်သို့ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ပင်လုံးပြန့်နှင့် ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက် ဆေးဖျန်းပြီးချိန်တွင် မှိုမျှင်၏ ကြီးထွားပွားများမှုကို ဟန့်တားပေးပါသည်။
- မှို၏ဆဲလ်များရှင်သန်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားပေးခြင်းဖြင့် မှိုဆဲလ်တွေကို သေစေပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အပင်အတွင်း အာနိသင်ကြာရှည်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့် ခဏခဏဖျန်းစရာမလိုဘဲ ရောဂါများကို အချိန်ကြာကြာ ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါသည်။
- သံချေး၊ မှိုသီးနှင့် ချေးဖတ်ရောဂါများကို အထူးကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- မှိုရောဂါများကို မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ဒါ့အပြင် သီးနှံပင်၏ အစာချက်လုပ်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုပါ တိုးစေသည့်အတွက်ကြောင့် ရောဂါကင်းပြီး အထွက်နှုန်းကို တိုးစေပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံ	ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောရောဂါများ
စပါး	ဂုတ်ကျိုးရောဂါ၊ ရွက်ဖုံးခြောက်ရောဂါ၊ မှိုသီးရောဂါ
ပြောင်း	သံချေး၊ တောင်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ မြောက်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ပြောင်းရွက်ပြောက်
ပဲမျိုးစုံ	သံချေးရောဂါ၊ ရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ ဖားဥမှိုရောဂါ
မြေပဲ	သံချေးရောဂါ၊ ပင်ခြေပုပ်ရောဂါ၊ စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်ရောဂါ၊ နှောင်းရွက်စက်ပြောက်ရောဂါ၊ ပင်စည်ပုပ်ရောဂါ

နှမ်း	နှမ်းရိုးမဲရောဂါ၊ အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်ရောဂါ	စာကိုစပိုးရား၊
ငရုတ်	မွဲပြောက်စွန်းရောဂါ၊ ကိုင်းဖျားခြောက်ရောဂါ	
ခရမ်းချဉ်	စောပင်နာကျရောဂါ	
ကြက်သွန်	တောက်တဲ့မြီးရောဂါ၊ ဂျီလိမ်/လည်လိမ်ရောဂါ	
အာလူး	စောပင်နာကျရောဂါ၊ ချေးဖတ်ရောဂါ	
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရုံ	ဖားဥမှိုရောဂါ၊ မွဲစွန်းရောဂါ	
မုန်ညင်းမုန်လာအုပ်စုဝင်အပင်များ	အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်	
စတော်ဘယ်ရီ	ပျော့ပုပ်(Botrytis)	
စပျစ်	ဖားဥမှိုရောဂါ၊ မွဲပြောက်စွန်းရောဂါ၊ ရွက်ပြောက်ရောဂါ	သံချေးရောဂါ၊
နှင်းဆီ	ရွက်နက်ပြောက်ရောဂါ၊ ဖားဥမှိုရောဂါ	
ဂန္ဓမာ	ဖားဥမှိုရောဂါ	

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဂုတ်ကျိုး၊ ရွက်ဖုံးခြောက်၊ မှိုသီး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ပြောင်း	သံချေး၊ တောင်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ မြောက်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ပြောင်းရွက်ပြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ပဲမျိုးစုံ	သံချေး၊ ရွက်ပြောက်၊ ဖားဥမှို	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
စပျစ်	ဖားဥမှို၊ မွဲပြောက်စွန်း၊ သံချေး၊ ရွက်ပြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

နှင်းဆီ	ရွက်နက်ပြောက်၊ ဖားဥမှို	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဂနွေ	ဖားဥမှို	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

သတိပြုရန်

- ဆေးသည် အပင်အောက်ဖက်မှ အထက်သို့ ပျံ့နှံ့စေသောကြောင့် အပင်ခြေသို့ ရွံ့ဖျန်းပေးနိုင်ပါသည်။

Name - Shwe Knowin

a.i - Azoxystrobin 25% SC

Product Feature

- It is protective, curative and eradivative effects.
- It is quickly absorbed by plants and rapidly enters in plant system with translocation acropetally.
- It's systemic and translaminar movement inhibits new growth of fungus after spray.
- It kills fungal cells through inhibition of cell membrane biosynthesis and cellular respiration.

Advantages

- It gives longer duration control thus reduces the number of sprays for the farmers.
- It highly effective against specific diseases like rusts, smuts and scabs.
- It control a wider range of fungal pathogens at different stage of development, offering enhanced efficacy.

- It enhances photosynthesis, improves stress tolerance, and can promote yield increases by reducing disease pressure.

Applicable crops	Target pests
Paddy	Blast, Sheath Blight, False Smut
Maize	Rust, Southern Leaf Blight, Northern Leaf Blight, Banded Leaf and Sheath Blight
Legumes	Rust, Leaf Spots, Powdery Mildew
Peanut	Rust, Collor Rot, Early Leaf Spot, Late Leaf Spot, Stem Rot
Sesame	Root Rot and Stem Rot (Charcoral Rot), Cercospora Leaf Spot, Alternaria Leaf Spot
Chili	Anthrachnose, Fruit Rot and Dieback
Tomato	Late Leaf Blight
Onion & Garlic	Purple Blotch, Anthracnose
Potato	Early Leaf Blight, Scab
Cucurbits	Powdery Mildew, Anthracnose
Brassica	Alternaria Leaf Spot
Strawberry	Botrytis Rot
Grapes	Powdery Mildew, Anthracnose, Rust, Leaf Spot
Rose	Black Leaf Spot, Powdery Mildew
Chrysanthemum	Powdery Mildew

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage	Method/ Applicable Time
------	--------------	--------	-------------------------

Paddy	Blast, Sheath Blight, False Smut	(40-50) cc per (16) L of water	Apply at the initial of the disease
Maize	Rust, Southern Leaf Blight, Northern Leaf Blight, Banded Leaf and Sheath Blight	(40-50) cc per (16) L of water	Apply in the early stage of the disease
Legumes	Rust, Leaf Spots, Powdery Mildew	(40-50) cc per (16) L of water	Apply in the early stage of the disease
Grapes	Powdery Mildew, Anthracnose, Rust, Leaf Spot	(40-50) cc per (16) L of water	Apply in the early stage of the disease
Rose	Black Leaf Spot, Powdery Mildew	(40-50) cc per (16) L of water	Apply in the early stage of the disease
Chrysanthemum	Powdery Mildew	(40-50) cc per (16) L of water	Apply in the early stage of the disease

Caution

- It spreads acropetally, so it should be sprayed thoroughly to the base of the plant.