

ဆေးအမည်

- မက်ဂါနီကိုး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i)

- Imidacloprid 5% + Cypermethrin 2.5% EC

ဆေးအာနိသင်

- ထိသေနှင့် ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး စုပ်စားပိုးနှင့် ကိုက်ဖြတ်ဝါးစားပိုးများကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံပင်၏ အမြစ် (သို့) အညွန့်များမှ စုပ်ယူပြီး အစာရေကြောစည်းများတလျှောက် ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ဆေးသည် ဖျက်ပိုး၏ ဗဟိုအာရုံကြောကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးပြီး အစာစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်းသေစေပါသည်။
- သီးနှံပင်တွင် အာနိသင်ကြာရှည်ခံပြီး ဖျက်ပိုးအား မြန်မြန်ဆေးထိရောက်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- မြေအောင်းပိုးများဖျက်ဆီးမှုမှ ကာကွယ်ရန် မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သလို မြေပြင်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက် ဆေးဖျန်းနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးအာနိသင်သည် အညွန့်နှင့် အရွက်သစ်များအထိ ပျံ့နှံ့နိုင်ပြီး ဖျက်ပိုးများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးစုပ်ယူမှုအားကောင်းသည့်အတွက် မိုးရေနှင့် သွင်းရေများကြောင့် အလွယ်တကူ မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
- အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် အကြိမ်ကြိမ်ဆေးအသုံးပြုစရာမလိုပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ	ပျ၊ လှေး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ ခူမွေးရှည်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဝါ	ဖြုတ်စိမ်း၊ ဝါဂွမ်းပိုးနီ၊ ပျ၊ လှေး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ၊ သစ်သီးပင်များ	ပျ၊ လှေး၊ ပိုးစေးနဲ၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ထွာကောင်စိမ်း၊ စိန်ကွက်ဖလံ၊ ခူမွေးရှည်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

Name - Mega Nicole

a.i - Imidacloprid 5% + Cypermethrin 2.5% EC

Product Feature

- It is systemic and contact insecticide designed to control sucking, biting, and chewing insects effectively.
- It is absorbed by plants through the roots or leaves and translocated throughout the vascular system, providing comprehensive protection.
- It acts on the central nervous system of insects, causing paralysis and eventual death.
- With systemic properties, it delivers long-lasting pest control and fast knockdown effects upon contact.
- It is versatile, suitable for use as a seed treatment or direct soil application to protect soil-dwelling pests.

Advantages

- It moves into new shoots and leaves, safeguarding the plant as it grows.
- Once absorbed, it is not washed off by rain or irrigation.
- It offers sustained protection, reducing the need for frequent spraying.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Legumes, Oil seed crops	Aphid, Thrip, Bean leaf roller, Hairy caterpillar	(20-40) cc per (16) L of water	Apply at the onset of the damage symptoms
Cotton	Leaf hopper, Red cotton bug, Aphid, Thrip, Cotton leaf roller	(20-40) cc per (16) L of water	Apply at the onset of the damage symptoms
Vegetables, Ornamentals, Fruits	Aphid, Thrip, Mealybug, Leaf hopper, Semi-looper, Diamond back moth, Hairy caterpillar	(20-40) cc per (16) L of water	Apply at the onset of the damage symptoms