

ဆေးအမည် - ရွှေဖျူရမ်

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Thiamethoxam 0.5% G

ဆေးအာနိသင်

- ထိသေ၊ စားသေနှင့် ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး စုပ်စားပိုးနှင့် မြေတွင်းအောင်းပိုးများကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ဖျက်ပိုး၏ ဗဟိုအာရုံကြောအင်္ဂါကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးပြီး အကြောဆွဲကာ အစာစားလိုစိတ်မရှိဘဲ တဖြည်းဖြည်းသေစေပါသည်။
- ဆေးဖျန်းလိုက်သည်နှင့် အပင်မှ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူပြီး အပင်၏ အစာရေကြောမှတစ်ဆင့် တစ်ပင်လုံးသို့ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- ဆေးထိရောက်မှုမြန်ဆန်ပြီး သီးနှံပင်တွင် အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့် အာနိသင်ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေသို့ ကြဲပက်၍သော်လည်းကောင်း၊ မြေကြီးထဲသို့ထည့်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် ဆေးအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ကာကွယ် နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ပိုးများ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဖြတ်စိမ်း၊ လှေး၊ နှံစုပ်ဂျပိုး၊ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး၊ ဆစ်ပိုး	(၁) ဧကလျှင် (၆-၇) ကီလို	သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်/သီးနှံပင်ကြီးထွားချိန်အစောပိုင်း (သို့) ပင်ခြေအနီးတွင် အသုံးပြုရန်
ခရမ်းချဉ်၊ သခွား၊ ငရုတ်	ယင်ဖြူ၊ လှေး၊ ပိုးစေးနဲ	(၁) ဧကလျှင် (၆-၇) ကီလို	သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်/သီးနှံပင်ကြီးထွားချိန်အစောပိုင်း (သို့) ပင်ခြေအနီးတွင် အသုံးပြုရန်
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ဝါ	ယင်ဖြူ၊ ပျံ၊ လှေး	(၁) ဧကလျှင် (၆-၇) ကီလို	သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်/သီးနှံပင်ကြီးထွားချိန်အစောပိုင်း (သို့) ပင်ခြေအနီးတွင် အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Furan

a.i - Thiamethoxam 0.5% G

Product Feature

- It is contact, stomach and systemic insecticide to control sucking and soil-dwelling pests.
- It disrupts the central nervous system of insects, causing paralysis and death.
- Upon application, it is absorbed by plants and translocated through the vascular system.
- It offers immediate knockdown and long-lasting residual effects.
- It can be used as a soil drench.

Advantages

- It provides prolonged protection, minimizing the frequency of application and saving costs.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Plant hopper, Thrip, Rice ear bug, Rice stem gall midge, rice stem borer	(6-7) kg per acre	Applied directly to the soil at the time of sowing/ early crop growth stages or applied in rows near the plant root zone
Tomato, Cucumber, Chili & Pepper	Whitefly, Thrip, Mealybug	(6-7) kg per acre	Applied directly to the soil at the time of sowing/ early crop growth stages or applied in rows near the plant root zone
Blackgram, Mungbean, Cotton	Whitefly, Aphid, Thrip	(6-7) kg per acre	Applied directly to the soil at the time of sowing/ early crop growth stages or applied in rows near the plant root zone