

ဆေးအမည် - ရက်ဒ်စပိုက်ဒါ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Fenpropathrin 20% EC

ဆေးအာနိသင်

- ဆေးဂန္ဓမာအုပ်စုဝင် ဖျက်ပိုးများကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေးနှင့် မွှားသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဖျက်ပိုးသည် ဆေးထိမိသည်နှင့် (သို့) စားမိသည်နှင့် ဖျက်ပိုး၏ အာရုံကြောစနစ်ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး ပေးပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းသေစေပါသည်။
- မွှားပင့်ကူကဲ့သို့သော စုပ်စားပိုးများနှင့် ဝါးစားပိုးများကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။
- အခြားအုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မှိုသတ်ဆေးများနှင့် ရောသုံးနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးဖျန်းပြီးနောက် အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် ဆေးအကြိမ်ကြိမ်ဖျန်းစရာမလိုပါ။
- ဖျက်ပိုးကို မြန်မြန်ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။

သတိပြုရန်

- အာနိသင်လျော့နည်းတတ်သည့်အတွက် အယ်ကာလီပါဝင်သောဆေးများနှင့် ရောသုံးသင့်ပါ။
- မိုးမရွာခင် နှင့် မိုးရွာနေသောအချိန်တွင် ဆေးမဖျန်းသင့်ပါ။ အနည်းဆုံး (၆-၁၂) နာရီ မိုးလွတ်ရပါမည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ	ပျ၊ လှေး၊ အစက်အပြောက်ပါသီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ယင်ဖြူ၊	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀- ၆၀) စီစီ	အကောင်ငယ်/ လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ဝါ	မွှားပင့်ကူ၊ ပျ၊ ယင်ဖြူ၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ဝါသီးလုံးဖောက်ပိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀- ၆၀) စီစီ	အကောင်ငယ်/ လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးပင်၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ	မွှားပင့်ကူ၊ ပျ၊ ယင်ဖြူ၊ လှေး၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ကော်လီရာဒိုကျိုင်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀- ၆၀) စီစီ	အကောင်ငယ်/ လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်

Name - Red Spider

a.i - Fenpropathrin 20% EC

Product Feature

- It is synthetic pyrethroid insecticide and acaricide used to control a wide range of pests.
- When pests come into contact with or ingest the chemical, it disrupts their nervous system, leading to paralysis and death.
- It is particularly effective against sucking and chewing insects.
- It is compatible with many other pesticides and fungicides.

Advantages

- It provides lasting protection for several days after application, reducing the frequency of sprays needed.
- It quickly kills pests after application.

Precaution

- Avoid using with products containing alkali, as this may reduce effectiveness.
- Do not spray before or during rainfall, as this can diminish result. Ensure dry weather conditions persist for at least 6-12 hours after application.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Legumes, Oil seed crops	Aphids, Thrips, Whitefly, Spotted pod borer,	(40-60) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or the early stage of nymph
Cotton	Mites, Aphids, Whitefly, Leaf hopper, Cotton bollworm	(40-60) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or the early stage of nymph
Vegetables, Fruits, Ornamentals	Mites, Aphids, Whitefly, Thrips, Leaf hopper, bollworm, Leaf miner, Colorado beetles	(40-60) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or the early stage of nymph