

ဆေးအမည် - ရွှေမီဒါ+

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Bifenthrin 10% + Imidacloprid 10% FS

ဆေးအာနိသင်

- ဆေးဂန္ဓမာအုပ်စုဝင်နှင့် နီယိုနီကိုတီနိုက်အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေး (၂) မျိုး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- ကိုက်ဖြတ်ဝါးစားပိုး၊ စုပ်စားပိုးနှင့် မြေတွင်းအောင်းပိုးများကို အာနိသင်နှစ်မျိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။
- ထိသေ၊ စားသေနှင့် ပင်လုံးပြန် အာနိသင်ရှိပြီး ဖျက်ပိုးများကျရောက်မှုကို ကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးသည် အပင်တွင်အာနိသင်ကြာရှည်ခံပြီး ဖျက်ပိုး၏ အာရုံကြောဆဲလ်များ၊ အာရုံကြောစနစ်ကို အဓိက နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။
- မျိုးစေ့များကို ပိုးမွှားရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အပင်ငယ်သေဆုံးမှုကိုလည်း နည်းစေသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- မျိုးစေ့နှင့် အပင်ငယ်များကို ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့်အတွက် မျိုးစေ့အညှောင့်ပေါက်မှု ညီညာစေပြီး အမြစ်ထွက်အားကိုပါကောင်းစေပါသည်။
- အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် မျိုးစေ့အညှောင့်ပေါက်ပြီးသည့်နောက် ဖျက်ပိုးများကို ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် ဆေးအသုံးပြုမှုကို လျော့ချပေးပါသည်။
- သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီးသည့်နောက်တွင် ဆေးအသုံးပြုရသည့်အကြိမ်အရေအတွက်နည်းစေသည့်အတွက် တောင်သူများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဖြုတ်စိမ်း၊ ဖြုတ်ညို၊ ဖြုတ်ကျောဖြူ၊ လှေး၊ ဆစ်ပိုး၊ ကြက်သွန်ခြိတ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်	မျိုးစေ့ (၂) တင်း- ရေ (၁) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
ပဲမျိုးစုံ	ပျ၊ လှေး၊ ပင်စည်ထိုးယင်	မျိုးစေ့ (၂) တင်း- ရေ (၁) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
ပြောင်း	ဖောငမြောင်တောင်၊ ပင်စည်ထိုးပိုး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း၊ ပျ	မျိုးစေ့ (၂) တင်း- ရေ (၁) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
မြေပဲ	ပျ၊ လှေး၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း	မျိုးစေ့ (၂) တင်း- ရေ (၁) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး
အာလူး	ပျ၊ လှေး၊ ယင်ဖြူ	(၃၀၀) ပိဿာ- ရေ (၁) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး

Name - Shwe Mida Plus

a.i - Bifenthrin 10% + Imidacloprid 10% FS

Product Feature

- It combines pyrethroid and neonicotinoid insecticides for enhanced pest control efficacy.
- It delivers a dual-action mechanism, effectively targeting chewing, sucking and soil-dwelling pests.
- With systemic, contact and stomach activity, it provides comprehensive early-stage pest protection.
- It ensures long-lasting residual control, disrupting the nervous system of pests, leading to paralysis and mortality.
- Primarily designed for seed-treatment, it also enhances seedling establishment by minimizing early-stage plant mortality.

Advantages

- It protects seeds and young seedlings from early pest damage, ensuring uniform germination and strong root establishment.
- Its long lasting effect provides extended protection against pests even after germination, reducing the need for early foliar sprays.
- It reduces the number of insecticide applications required after sowing, leading to lower costs for farmers in term of labor and chemicals.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Jassid, Brown plant hopper, White-backed plant hopper, Thrip, Stem borer, Rice Stem Gall Midge, Rice leaf floder	(50) cc per (1) L of water – (2) Tinn or basketful	Seed-treatment
Legumes	Aphid, Thrip, Bean stem fly	(50) cc per (1) L of water – (2) Tinn or basketful	Seed-treatment
Maize	Faw armyworm, Stem borer, White grub, Aphid	(50) cc per (1) L of water – (2) Tinn or basketful	Seed-treatment
Peanut	Aphid, Thrip, Whitegrub	(50) cc per (1) L of water – (2) Tinn or basketful	Seed-treatment
Potato	Aphid, Jassid, Whitefly	(50) cc per (1) L of waer - (300) viss	Seed-treatment