

ပိုဆီ

အာနိသင်

- စပါးပင်၏ ပင်စည်၊ အသီး၊ အရွက်နှင့် အမြစ်များကို ပိုမိုကြီးထွားသန်မာစေခြင်း။
- အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ဖြင့် ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ကို ဖြန့်ပေးခြင်း။
- စပါးအရွက်တွင်ရှိသော စတိုမာတာ (ခေါ်) လေရှူပေါက်များ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- အသီးအရွက်များ၊ ဥစားသီးနှံများ၏ အရည်အသွေး တိုးမြှင့်ပေးခြင်း။
- ပင်စည်မာကျောမှုနှင့် အရွက်ထောင်မတ်မှုကို ကောင်းစေခြင်း။
- အရွက်၏ ဖယောင်းလွှာကို ထူစေသောကြောင့် မှိုရောဂါ၊ ဘက်တီးရီးယားရောဂါနှင့် အင်းဆက်ပိုးများ၏ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
- အပင်ယိုင်လဲမှုဒဏ်၊ အဆိပ်သင့်မှု၊ ဆားငံဒဏ်၊ ရေငတ်ဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲရမည့်ဆေးနှုန်းထားပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀) စီစီ	စပါးပင်သက်တမ်း (၂၀-၃၀) ရက်သားမှ စ၍ (၇-၁၀) ရက်ခြား ပက်ဖျန်းရန်

Name - Posi

Ingredient - K₂O 16%: SiO₂ 25%

Product Feature

- Strengthens the stem, leaves, fruits, and roots of paddy plant.
- Facilitates the breakdown of carbohydrates to supply essential energy for plant growth.
- Regulates the opening and closing of stomata, ensuring optimal gas exchange.
- Enhances the quality and yield of fruits, vegetables and crops.
- Strengthens plant stems and promotes leaf turgidity.
- Thickens the leaf cuticle, providing protection against fungal and bacterial infections as well as insect damage.
- Improves plant resilience to lodging, toxicity, salinity, and drought stress.

Precaution

- The recommended application rate may vary depending on the soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	(50) cc per (16) L of water	Apply it (7-10) days apart, starting from (20-30) days after sowing