

တို(က်)-ပက်ကလို

အာနိသင်

- အရွက်တစ်သျှူးအတွင်းရှိ ကလိုရိုဖီးလ်၊ ပရိုတိန်း၊ အာဟာရဓါတ် ပါဝင်မှုကို များစေခြင်း။
- အထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက် ပန်းပွင့်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီး အသီးတင်နှုန်းများစေခြင်း။
- အစေ့အဆံနှင့် အသီးများကို ညီညာစွာ ရင့်မှည့်စေပြီး အရောင်အသွေးညီညာက သီးနှံအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း။
- သီးနှံပင်ကို ပန်းများများပွင့်စေရုံသာမက သီးနှံပင်များ၏ အာဟာရ စုပ်ယူမှုကို အားပေးခြင်း။
- ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အပင်ပေါ်သို့ ကျရောက်လာနိုင်မည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို လျော့နည်းစေနိုင်ခြင်း။ (ဥပမာ- နှင်းခါးရိုက်ခြင်း)
- မှိုရောဂါနှင့် ဘက်တီးရီးယားရောဂါ ကျရောက်မှုဒဏ်၊ ရေငတ်ဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- သီးနှံတစ်ရာသီလျှင် (၂) ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- မြေကြီးနှင့် အပင်များတွင် အစိုဓါတ်ကောင်းကောင်းရှိစေရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုချိန်
စပါး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် နို့ရည်တည်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဆေးရွက်ကြီး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	အပင်ကြီးထွားချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဂေါ်ဖီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	အပင်ကြီးထွားချိန်နှင့် ပန်းပွင့်ချိန်တွင်အသုံးပြုရန်
သရက်၊ လိမ္မော်	(၁) ပင်လျှင် (၄၀) ဂရမ်	ပန်းပွင့်ချိန်တွင်အသုံးပြုရန်

Name - Tide Paclo

Ingredient - Paclobutrazol 15 % WP

Product Feature

- Enhances chlorophyll, protein, and nutrient content in leaves, improving overall plant vitality.
- Promotes flowering and increases fruit-setting efficiency, leading to higher yields.
- Ensures uniform ripening of seeds and fruits, enhancing color consistency and overall crop quality.
- Not only stimulates abundant flowering but also enhances the plant's nutrient absorption.
- Mitigates adverse effects caused by environmental stress, such as frost damage.
- Strengthens plant resistance to fungal and bacterial infections, as well as drought conditions.

Precaution

- It can be applied up to (2) times per growing season.
- Adequate soil and plant moisture levels are essential for optimal effectiveness.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	(10-20) g per (16) L of water	To apply at flowering and milk & dough stages
Chili, Tomato, Potato	(10-20) g per (16) L of water	To apply at the beginning of flowering
Tobacco	(10-20) g per (16) L of water	To apply at the growth stage
Cabbage, Cauliflower	(10-20) g per (16) L of water	To apply at the growth stage and flowering stage
Mango, Orange	(40) g per plant	To apply at the beginning of flowering