

နိက်ထရမ်

အာနိသင်

- သီးနှံပင်များ ငယ်စဉ်တွင် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ အားလုံးပါဝင်စေရန် ဥရောပနည်းပညာဖြင့် အထူးဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် သီးနှံပင်ကြီးထွားမှု လျင်မြန်သန်မာစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များက အာဟာရများကို လွယ်ကူစွာ စုပ်ယူနိုင်ခြင်း။
- အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် အစာချက်လုပ်မှု ကောင်းမွန်စေခြင်း။
- ပိုးမွှား၊ ရောဂါနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ပိုမိုရှိစေခြင်း။
- ပန်းပွင့်သည့်အချိန်ထိ သီးနှံပင်ကြီးထွားမှုကို အားပေးခြင်း။

သတိပြုရန်

- သီးနှံအမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ဆေးနှုန်းထားပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
- အာနိသင်ထိရောက်မှုကောင်းစေရန် နံနက်ခင်းနှင့် ညနေနေအေးချိန်တွင် အသုံးပြုပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဝါ၊ ကြံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ အာလူး၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာ၊ မုန်ညင်း၊ မုံလာဥ၊ ဖရဲ၊ သခွားမွှေး၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကော၊ လိမ္မော်၊ သရက်၊ စပျစ်၊ သစ္စာပန်း၊ ဂန္ဓမာ၊ နှင်းဆီ၊ မေမြို့ပန်း၊ ကွမ်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၃၀) ဂရမ်	စိုက်ပျိုးပြီး (၁၄) ရက်သားမှစတင်၍ (၇) ရက်ခြား (၁) ကြိမ် အသုံးပြုရန်။

Name - Nitrum

Ingredients - N 30% : P2O 15% : K2O 10%

Product Feature

- Formulated with advanced European technology to supply essential nutrients for young crops, ensuring rapid and vigorous growth.
- Enhances nutrient absorption, allowing plants to efficiently uptake vital elements.
- Promotes chlorophyll production and optimizes photosynthesis for improved plant health and productivity.
- Strengthens resistance against pests, diseases, and environmental stresses.
- Supports continuous and healthy growth up to the flowering stage, maximizing crop potential.

Precaution

- Application rates may vary based on the crop.
- For maximum effectiveness, apply during the early morning or late afternoon.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy, Wheat, Maize, Legumes, Cotton, Sugarcane, Peanut, Sesame, Sunflower, Potato, Chili, Onion & Garlic, Eggplant, Cabbage, Cauliflower, Mustard, Radish, Watermelon, Lemon, Lime, Pomelo, Orange, Mango, Grapes, Gladiolus, Chrysanthemum, Rose, Aster, Betel	(10-30) g per (16) L of water	Begin application 14 days after planting and reapply at 7 day intervals