

နိက်ထရမ် (ဟိုင်း-ပီကေ)

အာနိသင်

- သီးနှံပင်များငယ်စဉ် လိုအပ်သောဓာတ်များ အားလုံးပါဝင်စေရန် ဥရောပနည်းပညာများဖြင့် အထူးစီမံဖော်စပ်ထားသောကြောင့် သီးနှံပင်များ၏ အသီး၊ အပွင့်၊ ဥ ကြီးထွားမှုနှင့် အရည်အသွေးကို အထူးကောင်းမွန်စေခြင်း။
- ရေတွင် ရာနှုန်းပြည့် ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး အာဟာရဓာတ်များအားလုံးကို အပင်က ရယူစားသုံးနိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်နှင့် ရောဂါဒဏ်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိစေခြင်း။
- ပန်းပွင့်မှု၊ အသီးသီးမှု၊ ရင့်မှည့်မှုများကို ပုံမှန်ထက်စောစေခြင်း။
- သီးနှံ၏ အရည်အသွေး အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အနံ့များကို သိသိသာသာ ပိုကောင်းစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- အခြားဝိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးများနှင့်လည်း ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းပြီး မိုးရွာပါက ထပ်မံပက်ဖျန်းသင့်ပါသည်။
- သီးနှံနှင့် မြေအမျိုးအစားကို လိုက်၍ အသုံးပြုရမည့်ဆေးနှုန်းထား အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဝါ၊ ကြံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ အာလူး၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာ၊ မုန်ညင်း၊ မုန်လာဥ၊ ဖရဲ၊ သခွားမွေး၊ ရှောက်၊ သံပရာ၊ ကျွဲကော၊ လိမ္မော်၊ သရက်၊ စပျစ်၊ သစ္စာပန်း၊ ဂန္ဓမာ၊ နှင်းဆီ၊ မေမြို့ပန်း၊ ကွမ်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) ဂရမ်	အသီးအပွင့် ဝင်ချိန်မှစတင်၍ (၇) ရက်ခြား (၁) ကြိမ် ပက်ဖျန်းရန်။

Name - NITRUM Hi-PK

Ingredients - N 5% : P₂O 30% : K₂O 30% : SO₃ 5.1% : MgO 1.02% : Fe EDTA 325 ppm, Mn EDTA 163 ppm, Zn EDTA 81 ppm, Cu EDTA 33 ppm, B soluble 81 ppm, Mo soluble 8 ppm

Product Feature

- Advanced European formulation ensures a complete range of essential nutrients for young crops, promoting optimal growth, flowering, fruit development, and superior quality.
- 100% water-soluble, allowing for maximum nutrient absorption by plants.
- Enhances resilience against climate fluctuations and disease stress.
- Accelerates flowering, fruiting, and ripening for an earlier harvest.
- Significantly improves size, color, smell and overall crop quality.

Precaution

- Can be safely mixed and applied with other insecticides and fungicides.
- If rainfall occurs after application, reapplication is recommended.
- Application rates may vary depending on the crop type and soil conditions.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy, Wheat, Maize, Legumes, Cotton, Sugarcane, Peanut, Sesame, Sunflower, Potato, Chili & Pepper, Onion & Garlic, Eggplant, Cabbage, Cauliflower, Mustard, Radish, Watermelon, Muskmelon, Lemon, Lime, Pomelo, Orange, Mango, Grapes, Gladiolus, Chrysanthemum, Rose, , Aster, Betel vine	(40-50) g per (16) L of water	Apply the treatment once every 7 days, beginning at the onset of flowering and fruiting