

ဟိုက်ပါကေ

အာနိသင်

- ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်ပြီး အခြားအာဟာရဓာတ်များ အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားခြင်း။
- ဆေးမှုန့်များ ရေတွင် ကောင်းစွာ ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း။
- အစာချက်လုပ်မှုအားကောင်းခြင်း။
- အမြစ်များထွက်အားကောင်းပြီး အစာအာဟာရ စုပ်ယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
- ပန်းပွင့်ရန် အားပေးပြီး မျိုးစေ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် အစေ့အဆံများ ပြည့်ဝစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- အရောင်နှင့် အရသာကောင်းခြင်း၊ ဆစ်ကြားတိုမှုမရှိခြင်း၊ အသီး၊ ဥများအောင်မြင်စွာ ကြီးထွားဖြစ်ထွန်းခြင်း။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်နှင့် ရောဂါများစွာကို ကျော်လွှားတိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း/ ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- အပင်၏ရေလိုအပ်မှုကို ထိန်းချုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး သီးနှံပင်၏ ရေငတ်ဒဏ်နှင့် အငန်ဓာတ်လွန်ကဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်စွမ်းအားတိုးစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များပေါ်တွင် (၂၁) ရက်ကြာသည်အထိ ရာနှုန်းပြည့်ဖုံးအုပ်ပြီး အာဟာရဓာတ်ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း။

သတိပြုရန်

- စပါး၊ ဝါ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်နီ/ဖြူနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးရာတွင် အထူးသုံးစွဲသင့်သည်။
- သီးနှံ (၁) ရာသီတွင် (၁၀) ရက်ခြား (၄) ကြိမ် အနည်းဆုံးပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။
- အခြားပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေး၊ အခြားဓာတ်မြေဩဇာတို့နှင့် ရောစပ်ပက်ဖျန်းခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပိုမိုလျင်မြန်ထိရောက်သည်။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုမည့်ဆေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဝါ၊ ကြံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ အာလူး၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာ၊ မုန်ညင်း၊ မုန်လာဥ၊ ဖရုံ၊ သခွားမွေး၊ ရှောက်၊ သံပရာ၊ ကျွဲကော၊ လိမ္မော်၊ သရက်၊ စပျစ်၊ သစ္စာပန်း၊ ဂန္ဓမာ၊ နှင်းဆီ၊ မေမြို့ပန်း၊ ကွမ်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၅၀) ဂရမ်	အပင်ငယ်ချိန်၊ ဖူးပွင့်စတင်ချိန်နှင့် အသီးကြီးထွားချိန်များတွင် ပက်ဖျန်းရန်။

Name - Hyper-K

Ingredients - N 7% : P₂O₅ 13% : K₂O 34% : MgO 2 % : Zn EDTA 1170 ppm, Fe EDTA 325 ppm, Mn EDTA 163 ppm, Mn EDTA 163 ppm, Cu EDTA 33 ppm, B Soluble 81 ppm, Mo Soluble 8 ppm

Product Feature

- Enriched with high potassium, precisely balanced with essential nutrients for optimal plant growth.
- Fully water-soluble, ensuring efficient absorption and utilization.
- Enhances metabolic activity, promoting better nutrient assimilation.
- Strengthens root development, improving nutrient and water uptake efficiency.
- Stimulates flowering and seed formation, ensuring well-developed and fully matured seeds.
- Improves fruit quality, enhancing color, flavor, and texture while preventing hollowness.
- Boosts plant resilience, providing resistance against environmental stress and various diseases.
- Optimizes water regulation, enhancing drought tolerance and salinity resistance.
- Ensures long-lasting nutrient availability, delivering sustained nourishment for up to 21 days.

Precaution

- Specifically formulated for optimal use in rice, sesame, various legumes, peanuts, onion & Garlic, and vegetable.
- Can be applied at least four times per growing season, with 10-day intervals between applications.
- Delivers enhanced efficiency when combined with insecticides, fungicides, or other fertilizers.
- The application rate may vary depending on the soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy, Wheat, Maize, Legumes, Cotton, Sugarcane, Peanut, Sesame, Sunflower, Potato, Chili & Pepper, Onion & Garlic, Eggplant, Cabbage, Cauliflower, Mustard, Radish, Watermelon, Muskmelon, Lemon, Lime, Pomelo, Orange, Mango, Grapes, Gladiolus, Chrysanthemum, Rose, , Aster, Betel vine	(10-50) g per (16) L of water	Apply during the early growth stage, flowering initiation, and fruit development stages