

ဒေါက်တာဘင်း (အသီးအထူး) (ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံအထူး)

အာနိသင်

- သီးနှံပင်၏ အရွက်အရောင် စိမ်းစိုတောက်ပခြင်း။
- ပင်စည်တုတ်ပြီး တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း။
- ပန်းပွင့်မှုအားကောင်းစေပြီး အသီးအပွင့်ကြီးထွားမှု အားကောင်းစေခြင်း။
- အစေ့အဆံများ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုကောင်းစေခြင်း။
- အဖျားသီး(နောက်ဆုံးသီး) အထိ အသီးတင်နိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရေငတ်ဒဏ်၊ ရောဂါဒဏ်နှင့် ပိုးမွှားကျရောက်မှုဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- အလေးချိန်စီးစေပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ကြာရှည်စွာ သိုလှောင်ထားနိုင်ခြင်း။

သတိပြုရန်

- ဆေးရည်အား အသုံးမပြုမီ ဆေးဗူးအား လှုပ်ခါ၍ သုံးစွဲပါ။
- နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင် ပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲရမည့်ဆေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ပဲမျိုးစုံ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၁၀၀) စီစီ	သီးနှံပင်များ အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်မှစတင်ပြီး သီးနှံတစ်ရာသီတွင် (၇-၁၀) ရက်ခြား (၂-၃) ကြိမ်ထိ အသုံးပြုရန်

Name - Dr. Bean (Pod) (Legumes & Oil-seed crops)

Ingredients - N 5%: P2O5 1.5%: K2O 2.5%: Ca 0.064 %: Mg 0.379%: S 1.191%: Mo 8000 ppm,
Fe 210 ppm, Zn 2470 ppm, B 2000 ppm

Product Feature

- Enhances vibrant green foliage for optimal plant health.
- Strengthens stems, ensuring durability and structural integrity.
- Promotes vigorous flowering and robust fruit development.
- Supports optimal seed formation and growth.
- Ensures consistent fruit production through the final stages.
- Enhances resilience against environmental stress, drought, diseases, and pest infestations.
- Improves yield quality, weight, and shelf life for extended storage.

Precaution

- Shake the bottle thoroughly before use.
- Suitable for application in the morning or evening.
- Dosage may vary based on soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Legumes	(50-100) cc per (16) L of water	Begin application from the flowering stage, applying (2-3) times per growing season at (7-10) day intervals