

ဒေါက်တာဘင်း (အသီး၊ အပွင့်၊ ဥအထူး) (ခရမ်းချုပ်၊ ငရှတ်၊ ဝါနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အထူး)

အာနိသင်

- သီးနှံပင်၏ အရွက်အရောင် စိမ်းစိတောက်ပခြင်း။
- အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးကာ ပင်စည်တုတ်ပြီး တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း။
- ပန်းများများပွင့်စေရန် လှိုဆော်ပေးပြီး နောက်ဆုံး အသီးအထိ အသီးတင်အားကောင်းစေခြင်း။
- အစွဲအဆုံးပြည့်ဝပြီး အထွက်နှုန်းကောင်းစေခြင်း။
- သီးနှံများ အလေးချိန်စီးပြီး အရည်အသွေးကောင်းစေခြင်း။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်၊ ရောက်ဒဏ်၊ ရောဂါဒဏ်နှင့် ပိုးမွားကျရောက်မှုဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- ရေတွင် ရာနှုန်းပြည့်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး သီးနှံပင်များ အလွယ်တကူ စုံပိုးနိုင်စေခြင်း။

သတိပြုရန်

- နံနက်ခင်းနှင့် ညာနေခင်းတွင် ပက်ဖျိန်းပါ။
- အသီး၊ အပွင့်၊ ဥ အထူး အားဆေးရည်အား အသုံးမပြုမဲ့ ဆေးဗူးအားလှုပ်ခါ၍ သုံးစွဲပါ။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မှုတည်၍ သုံးစွဲရမည့်ဆေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း / အသုံးပြုချိန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၁၀၀) စီစီ	သီးနှံပင်များ အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်မှစတင်ပြီး သီးနှံတစ်ရာသီတွင် (၇-၁၀) ရက်ခြား (၂-၃) ကြိမ်ထိအသုံးပြုရန်

Name - Dr. Bean (Fruit)

Ingredients - N 5% : P2O5 2.5% : K2O 2.5% : Ca 0.096 % : Mg 0.535% : S 1.152% : Mo 7100 ppm, Fe 230 ppm, Zn 2750 ppm, B 2200 ppm

Product Feature

- Enhances leaf color, promoting lush green foliage.
- Strengthens plant structure and root development with sturdy stems.
- Stimulates flowering and fruit development for higher yields.
- Improves seed formation and overall crop productivity.
- Enhances resistance to environmental stress, drought and diseases.
- 100% water soluble for fast and efficient foliar absorption.

Precaution

- Spray in the morning or evening for optimal effectiveness.
- Shake the bottle thoroughly before using the specialized booster for fruits, flowers, and tubers.
- The application rate may vary depending on soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Vegetables	(50-100) cc per (16) L of water	Begin application from the flowering stage, applying (2-3) times per growing season at (7-10) day intervals