

ဒေါက်တာဘင်း (အပင်အထူး) (ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်၊ ဝါနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အထူး)

အာနိသင်

- သီးနှံပင်၏ အရွက်အရောင် စိမ်းစိုတောက်ပခြင်း။
- ရွက်ညှာတုတ်ပြီး အပင်တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း။
- အရွက်များကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အားကောင်းပြီး အခက်အလက်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်း။
- အမြစ်ဆင်းအား ကောင်းစေပြီး အပင်အထမြန်စေခြင်း။
- ပန်းများများပွင့်စေရန်၊ အသီးတင်စေရန်၊ အစေ့အဆံပြည့်စေရန် လှုံ့ဆော်အားပေးခြင်း။
- ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရေငတ်ဒဏ်၊ ရောဂါဒဏ်နှင့် ပိုးမွှားကျရောက်မှုဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- သီးနှံပင်အား အာဟာရဓာတ်ညီမျှစေခြင်း။
- ရေတွင် လျင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်နိုင်စေပြီး သီးနှံပင် အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူမှု လွယ်ကူမြန်ဆန်စေခြင်း။

သတိပြုရန်

- သီးနှံပင်သက်တမ်း (၁၅) ရက်သားမှစ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲရမည့်ဆေးနှုန်းထား ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
- ပဲပင်များ၏ အရွက်အထက်အောက် မျက်နှာပြင် များကို စိုရွှဲအောင် ပက်ဖျန်းပါ။
- အသုံးမပြုမီ ဆေးဗူးအား လှုပ်ခါ၍ သုံးစွဲပါ။
- နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင် ပက်ဖျန်းပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၁၀၀) စီစီ	ပဲပင်များ မူမှန်ရွက် (၅) ရွက်ထွက်ချိန်/ စိုက်ပြီး (၁၅) ရက်သားမှစ၍ ပန်းပွင့်ချိန်ထိ (၇-၁၀) ရက်ခြား ဖျန်းပေးရန်

Name - Dr. Bean (Plant) (Vegetables)

Ingredients - N 9% : P₂O₅ 0.5% : K₂O 1% : Ca 0.048 % : Mg 0.262% : S 0.818% : Mo 7500 ppm, Fe 140 ppm, Zn 1710 ppm

Product Feature

- Enhances lush green foliage and healthy plant growth.
- Strengthens stems, making the plant more resilient and sturdy.
- Promotes healthy leaf growth and increases the number of branches.
- Improves root strength and accelerates plant growth.
- Boosts flowering, fruiting, and seed formation for improved yields.
- Improves resistance to environmental stress, drought, and diseases and pest infestations.
- Provides balanced nutrition for optimal crop performance.
- Fully water-soluble for quick and efficient foliar absorption.

Precaution

- Suitable for application from 15 days after planting.
- The application rate may vary based on soil type.
- Ensure thorough coverage by spraying both the upper and lower leaf surfaces, especially for legume crops.
- Shake the bottle well before use.
- Apply in the morning or evening for optimal effectiveness.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Vegetables	(50-100) cc per (16) L of water	Begin application at the fifth true leaf stage or 15 days after planting and continue spraying every (7-10) days until the flowering stage