

ဒေါက်တာဘင်း အပင်အထူး (ကြက်သွန်အထူးသီးသန့်)

အာနိသင်

- ကြက်သွန်ပင်၏ ကြီးထွားသန်မာစေခြင်းနှင့် ဥဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးခြင်း။
- အမြစ်ဆင်းအားကို ကောင်းစေပြီး အပင်အထအကြွမြန်စေခြင်း။
- အမြစ်များကို သန်မာစေပြီး အစာအာဟာရ စုပ်ယူမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။
- အပင်ကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေသည့်အတွက် ကြက်သွန် ဥပုပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးကာ ကြာရှည်သိုလှောင်နိုင်ခြင်း။
- ကြက်သွန်အနံ့ကို ကောင်းစေခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ကို များစေခြင်း။
- အပင်အစိမ်းရောင်ခြယ်ကို ဖြစ်စေသည့် ကလိုရိုဖီးလ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း။
- ကြက်သွန်ပင်၏ အင်ဇိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။
- သီးနှံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး ရောဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- အရွက်များ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးခြင်း (ဂျိုလိမ်၊ လည်လိမ်) ဖြစ်စေမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်း။
- ကြက်သွန်၏ အရည်အသွေး၊ အထွက်နှုန်း၊ သိုလှောင်နိုင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အတွက် ဈေးကွက်ဝင်အရည်အသွေးမြင့် ကြက်သွန်များကို ရရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်း နေအေးချိန်များတွင် အသုံးပြုရန်။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သည့်ဆေးနှုန်းထားပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ကြက်သွန်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၁၀၀) စီစီ	စိုက်ပြီး (၁၅) ရက်သားမှစတင်၍ ဥစတင်ဆင်းချိန်အထိ သီးနှံသက်တမ်းတစ်လျှောက် (၇-၁၀) ရက်ခြား အသုံးပြုရန်

Name - Dr. Bean Plant (Onion)

Ingredients - N 9%: P2O5 2%: K2O 2%: Ca 0.048 %: Mg 0.447%: S 0.502%: Mo 5000 ppm, Fe 190 ppm, Zn 70 ppm

Product Feature

- Supports vigorous vegetative growth and enhances bulb formation.
- Promotes strong root development and improve nutrient uptake.
- Strengthens cell walls, reducing bulb rot and improving storage quality.
- Boosts pungency, improves protein synthesis, and enhances disease resistance.
- Aids in chlorophyll formation and prevents leaf yellowing.
- Stimulates enzymes activity and improves growth and development.
- Enhances stress tolerance and improves overall plant health.
- Prevents leaf curling and twisting (anthracnose disease).
- Improves yield quality, storage life, and marketability of onions.

Precaution

- To be applied during cooler temperatures in the morning and evening.
- The application rate may vary depending on the soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Onion & Garlic	(50-100) cc per (16) L of water	Apply at intervals of (7-10) days throughout the growing season, beginning 15 days after planting until the onset of bulb formation