

ဒေါက်တာဘင်း (ကြက်သွန်ဥအထူးသီးသန့်)

အာနိသင်

- ကြက်သွန်ပင်၏ အမြိတ်(အရွက်) ကြီးထွားမှုကို အားဖြည့်ပေးပြီး အစာချက်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကြက်သွန်ဥ၏ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း။
- အမြစ်များများထွက်ပြီး ဥဖြစ်ပေါ်မှုကို စောလျင်စေခြင်း။
- ကြက်သွန်ပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း။
- ကလိုဖီးလ်ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်း။
- ကြက်သွန်ဥ၏ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်၊ အရည်အသွေး (အနံ့၊ အရောင်) ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ရောဂါဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- အရွက်များ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးခြင်း (ဂျိုလိမ်၊ လည်လိမ်) ဖြစ်စေမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးခြင်း။
- ကြက်သွန်ဥ၏ အရည်အသွေး၊ အထွက်နှုန်း၊ သိုလှောင်နိုင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အတွက် ဈေးကွက်ဝင်အရည်အသွေးမြင့် ကြက်သွန်များကို ရရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းများတွင် ပက်ဖျန်းပေးနိုင်သည်။
- မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုမည့် ဆေးနှုန်းထား အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၁၀၀) စီစီ	ကြက်သွန်ဥ စတင်ဆင်းချိန်မှ စ၍ သီးနှံသက်တမ်းတစ်လျှောက် (၇-၁၀) ရက်ခြား (၂-၃) ကြိမ် အသုံးပြုရန်

Name - Dr. Bean (Onion Bulb)

Ingredients - N 5% : P₂O₅ 2% : K₂O 2% : Ca 0.096 % : Mg 0.535% : S 1.152% : Mo 7100 ppm, Fe 230 ppm, Zn 2750 ppm, B 2200 ppm

Product Feature

- Supports vigorous leaf and shoot growth, enhancing photosynthesis for better bulb development.
- Strengthens root systems and promotes early bulb formation.
- Improves cell wall strength, reducing bulb disorders.
- Enhances chlorophyll production for efficient energy conversion.
- Boosts bulb size, weight, quality (pungency, color) and disease resistance, crucial for onion and garlic.
- Prevents leaf curling and twisting (anthracnose disease).
- Improves yield quality, storage life, and marketability of onions.

Precaution

- To be applied during cooler temperatures in the morning and evening.
- The application rate may vary depending on the soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Onion & Garlic	(50 – 100) cc per (16) L of water	Apply 2-3 times at 7-10 day intervals throughout the growing season, beginning at the onset of bulb formation