

ရွှေတောနစ်

အာနိသင်

- သီးနှံပင်၏ ကြီးထွားမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အရေးပါသော အပင်၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း။
- သီးနှံပင်အား စောစောရင့်မှည့်စေသည့်အတွက် ပန်းစောစောပွင့်ပြီး အသီးတင်စေခြင်း။
- သီးနှံပင်၏ အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
- မျိုးစေ့အညောင့်ပေါက်နှုန်းကို ကောင်းစေ၍ အမြစ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးသဖြင့် သီးနှံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း။
- သီးနှံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး ဟော်မုန်းကို ညီမျှစေခြင်းဖြင့် ပန်းပွင့်ကြွေခြင်း၊ အသီးကြွေခြင်းကို လျော့နည်းစေခြင်း။
- ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုဒဏ် (ရေငတ်ဒဏ်၊ ဆားငန်ဒဏ်၊ အပူချိန်မြင့်မားသည့်ဒဏ်) ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- အေး၍ခြောက်သွေ့သော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါ။
- အာနိသင်ကောင်းစွာထိရောက်စေရန် နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- သီးနှံနှင့် မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုမည့်ဆေးနှုန်းထား ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုချိန်/ အသုံးပြုနည်းလမ်း
နှံစားသီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးပင်များ၊ နှစ်ရှည်ပင်များ၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	(၁) သီးနှံပင်ကြီးထွားသန်မာစေရန် စိုက်ပြီး (၁၄-၂၁) ရက်သားတွင် အသုံးပြုရန် (၂) အဖူးအပွင့်စောစောဝင်စေရန် ပန်းပွင့်ချိန်မတိုင်မီတွင် အသုံးပြုရန် (၃) ပန်းပွင့်ကြွေမှု၊ အသီးကြွေမှု နည်းစေရန် ပန်းစပွင့်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန် (၄) သီးနှံပင်အား ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အစပြုချိန်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Shwe Tonic

Product Feature

- Activates key physiological processes to promote robust vegetative growth and overall plant vitality.
- Encourages early flowering and fruit set, allowing crops to reach maturity faster and improve crop cycles.
- Significantly improves both the quantity and quality of produce by optimizing nutrient utilization and metabolic efficiency.
- Increases seed germination rates and supports strong root initiation and growth, ensuring healthier plant establishment.
- Strengthens plant structure and hormonal balance to reduce premature flower and fruit drop, resulting in higher final yields.
- Enhances the plant's natural resilience to abiotic stresses such as drought, salinity, and temperature extremes, ensuring consistent performance under adverse conditions.

Precaution

- Store in cool, dry and well-ventilated area.
- Suitable for application in the morning and evening for optimal effectiveness.
- The application rate may vary depending on the crop and soil type.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Time/ Applicable Method
Cereal crops, Legumes, Vegetables, Fruits, Perennial crops, Ornamentals	(20-40) cc per (16) L of water	(1) To stimulate robust vegetative growth and enhance root initiation and development – at (2-3) weeks after germination or transplanting (2) To promote early flowering and bud formation – just before flowering begins (3) To enhance fruit set and reduce flower and fruit drop – during flowering and early fruit development period (4) To boost plant resilience under abiotic stress – apply preventively or at the onset of stress conditions