

ဂျီအေ-ဂိုး

အာနိသင်

- စပျစ်၊ ခရမ်းချဉ်ကဲ့သို့သော သီးနှံများတွင် သီးခိုက်ထွက်မှုများခြင်း၊ သီးခိုက်ရှည်ထွက်ခြင်း။
- ဂန္ဓမာကဲ့သို့သော ပန်းပင်များ ဖူးတံရှည်ထွက်မှု မြန်စေခြင်း။
- စပါးပင်များ အပင်အရပ်ညီညာ၍ အနှံထွက် ဂုတ်လွတ်မြန်စေခြင်း။
- ရှောက်သံပုရာ၊ သရက်ကဲ့သို့သော သီးပင်များ ရင့်မှည့်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုအေးချိန်တွင် အပင်ငယ်များ ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်နေခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေခြင်း။
- မျိုးစေ့/သစ်ဥသစ်ဖုများ ငုတ်ခြင်း (နားခြင်း) ကို ချေဖျက်ပေးပြီး အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းစေခြင်းနှင့် အပင်ငယ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များ ကြီးထွားမှု ညီညာစေခြင်း၊ အသီးအရွယ်အစားကြီးခြင်း၊ အရောင်အသွေးလှပခြင်းများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း။
- အခြားသောရွက်ဖျန်းအားဆေးများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

သတိပြုရန်

- အယ်လ်ကာလီပါသော ဆေးများနှင့် တွဲဖက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
- လေငြိမ်သောအခြေအနေတွင် အသုံးပြုရန်။
- အေး၍ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် အသုံးပြုရန်။
- အလွန်အမင်းကြီးထွားနိုင်သဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား	မျိုးစေ့တိုက်ရိုက်ချစိုက်ခင်းတွင် ကြွဲပြီး (၂၅-၃၅) ရက်သား (သို့) ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီး (၁၅-၂၀) ရက်သား
အာလူး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား	မျိုးစေ့ငုပ်ခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်စေရန် မစိုက်မီ မိနစ် (၃၀) တွင် စိမ်ရန်
စပျစ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား	ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်

GA-GOLD

Product Feature

- Promotes uniform fruit setting and elongation in crops like grapes and tomatoes.
- Enhances the rapid elongation of flower stalks in ornamental plants such as chrysanthemum.
- Ensures uniform growth and accelerates panicle initiation and emergence in rice crops.
- Regulates and controls the ripening process in fruit crop such as citrus, mango.
- Helps overcome growth retardation in young plants during cold weather conditions.
- Effectively breaks dormancy in seeds, tuber, and buds, enhancing germination rates and promoting vigorous seedling growth.
- Encourages uniform plant growth, improves fruit size, and enhances color and appearance.
- Can be safely combined and used with other foliar fertilizers.

Precaution

- Do not mix with strong alkaline substances or incompatible agrochemicals unless confirmed safe.
- Apply during calm weather conditions to prevent drift to non-target crops.
- Store in a cool, dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and moisture.
- Avoid over-application to prevent undesirable growth effects.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	(5) g tablet per (16) L of water	At (25-35) days after sowing in direct-seeded field/ (15-20) days after transplanting
Potato	(5) g tablet per (16) L of water	Soak the seeds for 30 min before planting to break dormancy and promote sprouting
Grapes	(5) g tablet per (16) L of water	At flowering stage and fruit setting stage