

ဆေးအမည် - ရွှေဒိုင်မီ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Lambda-cyhalothrin 2.5% EC

ဆေးအာနိသင်

- ပိုင်ရီသရိုက်ဆေးအုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီး ဆေးထိမိလိုက်သည်နှင့် ဖျက်ပိုး၏ ပင်မအာရုံကြောစနစ်ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကာ ဖျက်ပိုးကို သေစေနိုင်သည့် ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
- ထိသေ၊ စားသေ အာနိသင်ရှိပြီး သီးနှံအားလုံးတွင် ကျရောက်သည့် ဖျက်ပိုးအားလုံးကို နှိမ်နင်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- ဖျက်ပိုးအား အာနိသင် လျင်မြန်စွာထိရောက်မှုရှိပါသည်။
- ဖျက်ပိုး၏ အကောင်ကြီး၊ လောက်ကောင်အဆင့်အပြင် ဥများထိပါ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ထိသေ၊ စားသေ အာနိသင်ရှိသည့်အလျောက် ဖျက်ပိုးမှာ ထိမိ၊ စားမိလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အချိန်တိုအတွင်း အကြောဆွဲကာ သေဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။
- စုပ်စား၊ ခြစ်စား၊ ကိုက်စားပိုးများအပြင် လိပ်ပြာဖလံများ၏ လောက်ကောင်အဆင့်များကိုပါ နှိမ်နင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
- သီးနှံပင်ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေဘဲ ပဲသီးနှံတွင်မူ မြစ်ဖုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် အထွက်နှုန်းကိုပါ မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။
- အခြားပိုးသတ်ဆေးများနှင့် တွဲသုံးနိုင်ပြီး ဆေးအာနိသင်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

သတိပြုရန်

- ခြောက်သွေ့၍ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာ၊ နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန်။
- ကလေးများနှင့် ဝေးသောနေရာတွင် ထားသိုရန်။
- အသားအရေ၊ မျက်လုံးများနှင့် မထိတွေ့အောင် သတိပြုရန်။
- ဆေးဖျန်းမည်ဆိုပါက မှန်ကန်သည့် အသုံးပြုနည်းလမ်းအတိုင်း ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဆစ်ပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်၊ ဖြုတ်၊ ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
ပဲမျိုးစုံ	ပျ၊ လှေး၊ ၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
မြေပဲ၊ နှမ်း	လှေး၊ ရွက်ထွင်း၊ ဖြုတ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
ပဲပုပ်	ယင်ဖြူ၊ ဖြုတ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာ	ပျ၊ လှေး၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ဖြုတ်စိမ်း၊ ခေါင်ညွန့်ထိုးပိုး၊ ပျ၊ စိန်ကွက်ဖလံ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
ရှောက်	ရွက်ထွင်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်
သရက်	ဖြုတ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀-၆၀) စီစီ	ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာစတင်တွေ့ရှိချိန်

Name - Shwe Dime

Active Ingrdient - Lambda-cyhalothrin 2.5% EC

Product Feature

- This product is a pyrethroid insecticide that kills target pests systemically and on contact by interfering with cholinesterase and consequently nervous system action.
- It is a broad spectrum insecticide having systemic, contact and stomach mode of action.
- It also delivers a fast knockdown effect on insects.
- It also has miticidal activity which can eliminate eggs, larvae and adults.

Advantages

- As it has contact and stomach action, it causes rapid paralysis and death to an insect when ingested or exposed externally.
- It delivers powerful protection against key piercing, sucking and chewing including caterpillar pests.
- It breaks down quickly, causing no harm to the plant and enhances nodules and yield in leguminous plants.
- It is highly compatible and having synergistic effect with other insecticides.

Caution

- It should be kept in a dry, ventilated place and avoid direct exposure to sunlight.
- Store away from the children.
- Avoid contact with skin, eyes and follow proper handling techniques when applying this product.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Stem borer, Leaf folders, Leafhoppers, Rice Stem Gall Midge	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms
Legumes	Aphid, Thrip, Pod borers	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms
Groundnut, Sesame	Leaf hoppers, Thrips, Leafminers	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms
Soybean	Whiteflies, Leafhoppers, Green leafhoppers	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms

Tomato, Eggplant, Cabbage, Cauliflower	Aphids, Thrips, Fruit borers, Jassids, Shoots & Fruit borers, Aphids, Caterpillars, Diamondback moth	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms
Citrus	Leaf miners	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms
Mango	Hoppers, Leaf hoppers	(50-60) cc per (16) L of water	To apply at the onset of damage symptoms