

ဆေးအမည် - ရွှေအိုးလေး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(Ai) - Oxadiazon 25% EC

ဆေးအာနိသင်

- ရွှေအိုးလေးသည် ထိသေအာနိသင်ရှိ ပေါင်းအုပ်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
- ပေါင်းမပေါက်မီအချိန်နှင့် ပေါင်းပေါက်ပြီး အစောပိုင်းအချိန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ပေါင်းပင်ကြီးထွားဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း ဟန့်တားပေးသောကြောင့် ပေါင်းပင်အတွက် အစာချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်သွားစေပါတယ်။
- ပေါင်းမျိုးစေ့ မကြီးထွားခင်အချိန် ပေါင်းပင်ငယ်စဉ်မှာ သေစေပြီးတော့ ဆဲလ်ကြီးထွားခြင်း လုပ်ငန်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။
- မြက်မျိုးရင်း၊ ရွက်ပြန့်ပေါင်းနှင့် မြက်မုန်ညှင်းမျိုးစေ့များ ပေါက်မလာအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါတယ်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- စပါးအခြောက်ကြဲခင်းတွင်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- မြေအောက်အစိုဓာတ် (၁) လက်မကျော် (၂) လက်မအထိ စိမ့်ဝင်နိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းပြီး (၇ - ၁၀) ရက်အတွင်းမှာ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။
- မြက်၊ ရွက်ပြန့်ပေါင်းနှင့် မုန်ညှင်းမျိုးစေ့များကို အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း (၄၅) ရက်အထိ နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
- ပေါင်းပေါက်ရောက်ခြင်းကို ကာလအတန်ကြာ ထိန်းပေးထားနိုင်သောကြောင့် ပေါင်းသတ်ဆေး ခဏခဏ အသုံးပြုရခြင်းမှ ကင်းဝေးကာ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်/ ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေရန် အထူးဂရုပြုပါ။
- ရွှေအိုးလေး အသုံးပြုချိန်တွင် မြေအစိုဓာတ် (၂-၃) လက်မရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိုက်နင်းပေးနိုင်သောပေါင်းများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုရမည့်အချိန်
စပါး (အခြောက်ကြဲခင်း)	ဝမ်းဘဲစာ၊ ဖော့မြက်(မြက်ဝမ်းပူ)၊ လက်သဲစောင်း၊ တက်ကွက်၊ တက်ပွတ်၊ ဒေါင်းမြီးပျံ၊ မြက်မုန်ညှင်း၊ လယ်ပဒူ၊ မှိုနတို၊ မြက်စိမ်းပုတ်၊ ကန်စွန်း၊ ဝက်ကျွတ်နှင့် အခြားသောပေါင်းများ။	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် ဆေး (၁၀၀-၁၂၅) စီစီ	အခြောက်ကြဲပြီး (၅-၇) ရက်အကြာ/ မိုးရွာပြီး (၂- ၃) ရက်အတွင်း

Product Name - **Shwe Ooh Lay**

A.i - **Oxadiazon 25% EC**

Product Feature

- Shwe Ooh Lay is contact herbicide.
- It can be used pre-emergence and early post-emergence herbicide.
- It controls weeds by inhibiting an enzyme essential for plant growth.
- This enzyme is involved in the production of chlorophyll, which is necessary for photosynthesis.
- Inhibiting this enzyme disrupts cell wall development, causing the young weed seedlings to die before emerging.
- It prevents the germination of grass, broadleaf weeds and mustard seeds.

Advantage

- Can be used in dry seeded rice fields.
- Penetrate up to (1-2) inches of soil moisture.
- Weed control becomes visible within (7-10) days after application.
- Suppresses grasses, broadleaf weeds and mustard seeds for at least (45) days.
- Provides long-lasting weed control, reducing the need for frequent herbicide application and saving costs.

Precaution

- Use **only clean water** when mixing the herbicide.
- Take special care to **avoid excess water** in the planting areas.
- The soil should be **moist (2–3 inches)** at the time of application.

Use and Recommendation

Crops/ Crop Type	Target weeds	Dosage	Method/ Applicable Time
Rice (Dry seeded)	Grass, Broadleaf weeds & Mustard seeds	(100-125) cc per (16) L of water	5–7 days after seeding or 2–3 days after rainfall