

ဆေးအမည် - ရွှေပေါင်း-၂

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(Ai) - Bensulfuron-methyl 10%, Bispyribac-sodium 25% WP

ဆေးအာနိသင်

- ရွှေပေါင်း-၂ဆေးသည် ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး စပါးရွေးချယ် ရေဖျော်ပေါင်းသတ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
- ပေါင်းမပေါက်မီအချိန်နှင့် ပေါင်းပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ပေါင်းပင်၏ အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဟန့်တားပေးပါသည်။
- အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ပေါင်းပင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်စစ်ထုတ်လုပ် ခြင်းနှင့် အပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကာ ပေါင်းပင်ကို သေစေနိုင်ပါတယ်။
- ဘန်ဆာယူရမ်မီသိုင်းသည် စပါးပင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ပေါင်းပင်၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို အလျှင်အမြန်ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- စပါးခင်းအတွင်းရှိ ပေါင်းမြက်များ ပေါက်မလာအောင် ကာကွယ်ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
- ပေါင်းပေါက်ရောက်ခြင်းကို ကာလအတန်ကြာ ထိန်းပေးထားနိုင်သောကြောင့် ပေါင်းသတ်ဆေး ခဏခဏ အသုံးပြုရခြင်းမှ ကင်းဝေးကာ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင် ရေကြည်/ ရေသန့်ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- စပါးခင်းအတွင်း ရေအစိုဓာတ် လုံလောက်စွာရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိုင်းနင်းပေးနိုင်သောပေါင်းများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုရမည့်အချိန်
စပါး	ဝမ်းဘဲစာမြက်၊ ဘဲစာမြက်၊ ဆင်ငိုမြက်၊မြက်မုန်ညှင်းပေါင်းများ၊ လယ်ပဒူ၊ မွှန်တိုနှင့် အခြားသောပေါင်းများ။	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် ဆေး (၃၀) ဂရမ်	စပါးစိုက်ပြီး (၁၂-၁၅) ရက်သား

Product Name - **Shwe Paung 2**

A.i - **Bensulfuron-methyl 10%, Bispyribac-sodium 25% WP**

Product Feature

- Shwe paung 2 is a systemic and selective herbicide.
- It can be used for both pre-emergence (before weed seedlings emerge) and post-emergence (after weed seedlings emerge) control.
- It controls weeds by inhibiting an enzyme that is crucial for the synthesis of essential amino acids.
- Inhibiting this enzyme disrupts plant growth and development, leading to weed death.
- Rice crops are generally less susceptible to bensulfuron-methyl due to their ability to rapidly metabolize the herbicide.

Advantage

- Effectively prevents weed growth in rice fields.
- Provides long-lasting weed control, reducing the need for frequent herbicide applications and saving costs.

Precaution

- Use only clean water to mix the herbicide.
- Ensure there is sufficient moisture in the rice field at the time of application.

Use and Recommendation

Crops/ Crop Type	Target weeds	Dosage	Method/ Time	Applicable
Rice	Annual and perennial weeds, including grasses, sedges and broadleaf weeds	(30) g per (16) L of water	(12-15) days after sowing	