

မိုဂျီ

အာနိသင်

- အပင်ကြီးထွားမှုမြန်ခြင်းနှင့် အမြစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားကောင်းစေပြီး အမြစ်သန်မာစေခြင်း။
- အချိန်မှန်ပန်းပွင့်ပြီး ပန်းပွင့်နှုန်းအားနှင့် အသီးတင်နှုန်းတိုးခြင်း။
- သီးနှံပင်များ၏ ပန်းပွင့်နှင့် သီးကင်းကြွေကျမှု လျော့နည်းစေနိုင်ခြင်း။
- မြေချဉ်၊ မြေငံ၊ ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် ရေငံဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ရေဝပ်နိုင်သော မြေများတွင် သီးနှံပင်ကောင်းစွာ ကြီးထွားစေနိုင်ခြင်း။
- ပိုးမွှားနှင့် အပင်ရောဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- သီးနှံများ အရည်အသွေးကောင်းပြီး အထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များ ပေါင်းသတ်ဆေးလောင်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- ဆေးအားနံနက်စောစောနှင့် ညနေ နေအေးချိန်များတွင် အသုံးပြုရန်။ ဆေးဖျန်းပြီးနောက် မိုးရွာပါက မိုးရွာပြီး (၆) နာရီအကြာတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုရန်။
- အနည်းဆုံး (၁၅) ရက်ခြား (၁) ကြိမ် အသုံးပြုရန်။ (၃) ကြိမ်ထက်ပို၍ အသုံးမပြုရန်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
နှံစားသီးနှံများ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ စက်မှုသီးနှံများ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ချင်း/နနွင်းနွယ်ဝင် အပင်များ၊ သစ်သီးဝလံများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၅) ဂရမ်	အပင်ကြီးထွားချိန်မှ အသီးဝင်ချိန်အထိ အသုံးပြုရန်။ ဆိုးရွားသော ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် ရှိနေချိန်။

Name - Moji

Product Feature

- Promotes rapid vegetative growth and healthy root development, strengthening the root system.
- Supports timely flowering, increasing both the flowering rate and fruit set.
- Reduces flower and fruit drop in fruit-bearing plants.
- Enhances tolerance to acidic or saline soils, adverse weather conditions, and waterlogging, enabling crops to grow well even in challenging soils.
- Improves resistance to pests and plant diseases.
- Enhances fruit quality and increases overall yield.
- Relieve the phytotoxicity cause by herbicides.

Precaution

- Apply in the early morning or late afternoon to prevent high temperatures and scorching sun.
In the case of rainfall, reapply after 6 hours.
- Maintain an interval of at least 15 days between applications, and do not spray more than 3 consecutive times.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Cereal crops, Oil-seed crops, Legumes, Industrial crops, Perennial crops, Vegetables, Rhizome plants, Fruits	(15) g per (16) L of water	Apply from vegetative stage to fruit/seed development stage and apply under stress conditions.